

Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs

FrøavlsINFO nr. 6, 2017

- Mulighederne for bekæmpelse af to kimbladet ukrudt er mange, så valget må gå efter effekt på problemukrudt og pris

Det er nu tid til at artsbestemme tokimbladet ukrudt i frøgræsmarken, for at få valgt den løsning, der bedst kan klare problemerne. I marker udlagt i renbestand er det ofte nødvendigt at påbegynde ukrudtsbehandlingen tidligt i foråret, alt efter hvordan behandlingen i efteråret har virket. Primus/Saracen indeholder udelukkende aktivstoffet florasulam.

Catch, Starane XL og Mustang Forte indeholder florasulam i blanding med et andet aktivstof. Blandinger er en fordel i forhold til resistens. Nedenfor er udvalgt fire løsninger til forskellige situationer:

Mustang Forte

Mustang Forte bekæmper de fleste tokimbladete ukrudtsarter og har samtidig også en sideeffekt på visse rodukudtsarter. Effekten er dog svag på agerstedmoder og ærenpris, og derfor skal der iblandes DFF for at forstærke effekten. Mustang Forte er en af de billigste løsninger. Mustang Forte må anvendes til stadie 32, og har nogle restriktioner i forhold til halm og efterfølgende afgrøde, som skal overvejes inden anvendelse. Er der i sædskiftet andet end græs, korn, raps eller majs, eller skal halmen sælges til andet end industri eller afbrænding, bør man sætte sig grundigt ind i restriktionerne.

0,5-0,75 l/ha Mustang F. + 0,05-0,07 l/ha DFF

Catch

En løsning med Catch giver en god ukrudtsbekæmpelse, men bekæmpelsen af burresnerre, kornblomst, rodukudt og raps er ikke på niveau med Mustang Forte. Catch har problemer med agerstedmoder og ærenpris, og derfor kan der med fordel tilsættes DFF for at forstærke virkningen. Oplagt løsning hvor Mustang Forte ikke er muligt.

0,4-0,6 l/ha Catch + 0,05-0,07 l/ha DFF

Ariane FG S og Primus

Ariane FG S kan anvendes i 1. års marker udlagt i korn med op til 2,5 l/ha. I 2. års marker kan Ariane FG S anvendes op til 3,5 l/ha. Er særlig aktuel, hvor der er tidsler i frømarken. Temperaturkrav mindst 10-12°C. Kombinationen af Ariane FG S og Primus er en all-round løsning mod frø- og rodukudt. Er god ved en sen behandling og sprøjtningen udsættes til sidst i april/først i maj. (Ariane FGS må ikke bruges i renbestands-udlæg)

1,5-2,5 l/ha Ariane FGS + 0,05 l/ha Primus

Starane XL

Er det Storkenæb og Hejrenæb der er hovedproblemet er der en god mulighed i Starane XL. Temperaturkravet er på 15°C, hvilket ofte gør at behandling må trækkes til maj.

1,5 l/ha Starane XL

Følgende midler herunder er omfattet af off-label eller minor use. Vejledningen for de enkelte midler kan hentes her (Klik på midlet):

[DFF](#), [Mustang Forte](#) og [Catch](#)

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF