

Efterårsbehandling af alm. rajgræs

FrøavlsINFO nr. 15, 2017

- **Afpudsning**
- **0,12 l pr. ha Agil bekæmper spildkorn**

Behandling af rajgræs udlagt i vårbyg

Langt størstedelen af alm. rajgræs er udlagt i vårbyg i foråret. Hvis kornet er høstet med lang stub, anbefaler vi en afpudsning af stubben efter høst, så stubben ikke skygger for solen.

Hvis frøudlægget er tilmeldt som MFO, er der nu indført restriktioner på afpudsning. Det er tilladt at afpudse dæksædsstubben lige efter høst, og der må gerne tages slæt eller afgræsses. Men man må ikke afpudse græsset og lade materialet blive liggende. Dette gælder frem til MFO periodens afslutning.

Bekæmpelse af spildkorn

Hvis spildet af vårbyg i forbindelse med høst er på et lavt niveau kan en ekstra sen afpudsning af spildkornsstriberne ofte være nok. Ved en normal vinter vil byggen herefter udvinde.

Hvis der er kraftige spildkornsstriber, er en behandling med 0,12 l Agil pr. ha en god løsning. Der behandles, når byggen har 1-2 blade. Særligt i plænesorterne kan spildkorn konkurrere med græsset i efteråret.

Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt

Har ukrudtsbekæmpelsen i foråret i dæksæden været optimal, er der ikke behov for yderligere bekæmpelse her i efteråret. Hvis der er stor forekomst af kamille, raps, fuglegræs eller andet, kan en behandling være aktuel. En blanding af 0,05 l DFF + 7,5 g Express SX pr. ha er aktiv mod de fleste ukrudtsarter. Man skal være opmærksom på at det i de fleste tilfælde også er nødvendigt at behandle mod ukrudt om foråret. Mange spildplanter af raps kan udløse en efterårsbehandling. Dels bliver rapsen ofte

meget stor, inden man kan bekæmpe den om foråret, og dels er det ikke være hensigtsmæssigt at have spildraps stående i frømarken, da der herved kan opformeres kålbrot i et falsk sædskifte.

Kvælstof i efteråret

Er udlægget efter høst af vårbyg meget svagt, kan det tildeles 20-30 kg N pr. ha. Denne startgødning kan være aktuel særlig i plænesorter. Uanset tildeling af ekstra kvælstof i efteråret, skal der gødes normalt til foråret. Udlæg i renbestand skal altid tildeles 30-40 kg N pr. ha om efteråret.

Ukrudtbekæmpelse ved udlæg i renbestand

Vi har i FrøavlsINFO nr. 13 informeret om ukrudtsbekæmpelse ved [udlæg i renbestand](#). Det er meget vigtigt at få udført en effektiv ukrudtsbekæmpelse her, da enårig rapgræs og andet ukrudt ellers kan tage overhånd.

Behandling forud for 2. års høst

Efter at halmen er fjernet, skal de gamle planterester pudses helt i bund, så den gamle stub bliver afhugget tæt ved jorden. Denne afpudsning er meget vigtig, da der ellers vil dannes vildskud, som ikke bidrager til frøudbyttet. Følg op med en eller to afpudsninger senere på efteråret.

Hvis der er behov for grovfoder, er et alternativ at gøde marken straks efter høst med 60-70 kg N pr. ha. Kvælstoffet kan evt. tildeles i gylle. Der skal dog ikke tildeles mere end 60-70 kg udnyttet N pr. ha, da græsset gerne skal gå af groning sidst på efteråret. Slættet tages ca. 1. oktober. Når væksten går i stå i sidste halvdel af oktober bør græsset have en højde på 6 til 10 cm.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF