

Bladsvampe i alm. rajgræs, opfølgning

FrøavlsINFO nr. 9, 2017

- Kronrust, bladpletsvamp og meldug ses tidligere end sortrust
- God rentabilitet for svampebekæmpelse

Indtil videre har kronrust været mest udbredt, og der er udløst bekæmpelse i 80 procent af de ubehandlede marker i den sidste registrering. Bekæmpelse af kronrust anbefales ved 0,1 procent dækning. Meldug forekommer også i nogle marker, men anbefales kun bekæmpet indtil skridning. Bladplet forekommer også i flere marker.

Frøavls- og planteavlskonsulenter indberetter angrebene til [registreringsnettet](#), og udviklingen af kronrust kan ses i figuren nedenfor.



Den vigtigste svampebehandling udføres ved blomstring som er overstået for nogle sorters vedkommende og i fuld gang for andre. Det er vigtigt at holde øje med markerne fra begyndende blomstring og de næste tre uger. I denne periode er der i forsøgene opnået de største merudbytter for svampebekæmpelse. I marker, hvor der er investeret i ekstra gødning og vækstregulering, må merudbyttet ikke sættes over styr ved at undlade den sidste vigtige svampebehandling.

Kronrust kan specielt udvikle sig kraftigt i den sidste del af vækstperioden, hvor angrebene i nogle tilfælde ses helt op på de øverste blade. Dette er nok en medvirkende årsag til, at det er de sene behandlinger op mod skridning, der er de mest lønsomme.

Sortrust-risiko under varme forhold

I de senere år har vi set angreb af sortrust på nogle lokaliteter. Sortrust er en meget aggressiv og udbyttekrævende svamp som kan forventes, såfremt vi får tørt og varmt vejr efter blomstring i juni. Det er derfor en svampesygdom, vi skal være godt forberedt på.

Vi har set flere eksempler på at sortrust først opdages omkring 1. juli. Vær specielt opmærksom i rajgræs udlagt i renbestand, som er mere modtagelig for sortrust end rajgræs udlagt i vårbyg.



Bladpletsvamp

Net- og pletnekrose bekæmpes i fugtige år ved over 10 pct. angrebne planter indtil afsluttet blomstring. Bladpletsvampene kan ved meget fugtige forhold udvikle sig så meget at en bekæmpelse vil være fornuftig.

Aktuelle midler

Af svampemidler kan anvendes Orius 200 EW, Amistar, Comet Pro, Bell eller Viverda. Hvis frøgræshalmen skal opfodres, er kun Amistar og Orius godkendt.

Til bekæmpelse af kronrust, bladplet og sortrust kan anvendes omkring 0,45 l Bell eller 0,4 l Bell + 0,15 l Comet Pro eller 0,4 l Viverda pr. ha.

Skadedyr

Bekæmpelse af skadedyr som mider og lus kan være aktuel sammen med en kommende svampesprøjtning. Karate 2,5 WG er off-label godkendt til frøgræs.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF