

## 1. års engrapgræs, bortsprøjtning af hvidkløver

FrøavlsINFO nr. 10, 2017

- MCPA, både før og efter kløverhøst
- Zypar til bortsprøjtning af kløver i engrapgræs
- Hussar mod kløver og enårig rapgræs
- Snegle: 24-timers arbejdsdag i kløver

Mange avlere har i år brugt MCPA til at stoppe kløverens genvækst i høstperioden, men efter en periode vil hvidkløverens vækst starte igen.

### Bortsprøjtning af hvidkløver forud for engrapgræs

I de hvidkløvermarker, hvor der er udlagt frøgræs til høst 2018, skal kløvergenvæksten sprøjtes væk, så snart kløveren er i vækst.

Zypar er godkendt til mindre anvendelse til bortsprøjtning af hvidkløver i engrapgræs med 1 l/ha eller to gange 0,5 l/ha i august måned.

MCPA er godkendt til mindre anvendelse i engrapgræs til bortsprøjtning af kløver i en dosis på 1,0 l pr. ha. Tjek på [Middeldatabasen](#) hvilke handelspræparater af MCPA, der er godkendt. Anvendelse må ske frem til den 1. september, og midlerne må kun anvendes én gang pr. vækstsæson. MCPA anvendt til nedvisning før kløverhøst tæller med til sæsonen 2015/16.

Én behandling til bortsprøjtning af hvidkløver er ofte ikke tilstrækkeligt. Derfor skal der udføres en supplerende behandling i efteråret med 0,02 l Hussar OD pr. ha. Det følgende forår kan der suppleres med 0,08 Hussar OD. Bemærk, at Express og Hussar ikke må bruges i samme afgrøde, og Express er derfor ikke interessant.

Hussar Plus OD er endnu ikke blevet godkendt til anvendelse om efteråret.

Til bortsprøjtning af hvidkløver i engrapgræs anbefaler vi 1 l Zypar eller 1,0 l MCPA pr. ha så snart kløveren er høstet og senest 31. august, efterfulgt af 0,02 l Hussar OD + 0,5 l Renol pr. ha 10-14 dage senere, dog senest 15. september.

MCPA behandlingen vil også have en sideeffekt mod agertidsler, når disse er i god vækst.

Hussar vil foruden effekten på genvækst og nyfremspiret kløver også have effekt på småt enårig rapgræs.

### Snegle

Det nedbørsrige sommervejr giver risiko for et rigtigt snegleår. Så længe kløveren ikke er bortsprøjtet, er der 24-timers arbejdsdag og tagselv-buffet til sneglene. En hurtig bortsprøjtning af kløveren er derfor en fordel - både for at fjerne fødegrundlaget for sneglene og for at give plads til, at engrapgræsset kan udvikle sig. Vær opmærksom på at sneglene kan skade engrapgræsudlægget alvorligt.

Mod snegle kan der anvendes sneglekorn, jern(III)fosfat-granulat som f.eks. Ferramol/Sluxx. Hvis sneglekornene bliver ædt inden for få dage, skal der genbehandles. Det er den tidlige/første behandling, der sikrer at engrapgræsset får fodfæste. Kør sneglemidlet ud om aftenen, så det ikke ædes af måger m.m. inden sneglene får muligheden for at indtage måltidet.

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF