

Reglone i engrapgræs

FrøavlsInfo nr. 12, 2017

- Vintertid er Reglone-tid
- Frost øger effekten
- Vær klar til at rykke ud

Det regnfulde efterårsvejr har fremmet fremspiring og etablering af græsukrudt, så der vil i mange marker være behov for en behandling med Reglone i hele marken eller dele af marken i løbet af de kommende uger.

Det bedste behandlingstidspunkt i engrapgræs er fra første halvdel af december til midt i januar.

Det er vigtigt at få bekæmpet enårig rapgræs og alm. rapgræs, da disse arter ikke kan frarenses. Effekten overfor hejre, væselhale og spildplanter af vintersæd kan være rigtig god, såfremt Reglone-behandlingen udføres en solskinsdag op til en frostperiode.

Risiko for skade af Reglone i engrapgræs

Risiko for skade i engrapgræs er størst i svage 1. års marker med lille bladmasse, mindre udvikling af underjordiske udløbere, og i marker der ikke er gået af vækst. Sorter med lysegrønne blade er mest følsomme over for Reglone-behandling.

Engrapgræsplanter med større bladmasse tåler bedst Reglone. Derfor skal makrene ikke være barberet helt ned før vinteren.

Er du i tvivl om marken skal sprøjtes, så rådfør dig med din frøavlskonsulent.

Jo senere der sprøjtes efter midt i januar desto mere påvirket er engrapgræsset i foråret og jo dårligere er ukrudtseffekten.

Er der udført en sen Agil behandling i oktober, bør en opfølgende Reglone behandling være på max 1,5 l pr. ha.

Nye forsøg med splitbehandling

I 2015-17 har vi udført forsøg med splitbehandling af Reglone i engrapgræs. Første sprøjtning var med 0,8 l Reglone pr. ha i sol efterfulgt af 1,2 l pr. ha 10 dage senere. Forsøgene viser, at effekten overfor væselhale er bedre ved en splitbehandling.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Det er imidlertid ikke tilladt at splitbehandle med Reglone, men vi håber på en godkendelse.

Virkningsbetingelser af Reglone

Den bedste effekt af Reglone opnås ved sprøjtning sidst på formiddagen i klart vejr, gerne efter en frostperiode. Anvend rigeligt med vand, mindst 250-400 l vand pr. ha; den mindste vandmængde, hvor der er meget dug. Rim på bladene vil nedsætte effekten og frost efter behandlingen vil øge effekten på ukrudtet.

Husk at tilsætte 0,1 l sprede/klæbe middel pr. 100 l vand.

Ved temperaturer omkring frysepunktet kan der tilsættes 10 - 12 pct. flydende gødning til sprøjtevæsken for at undgå is i dyserne. I så fald undlades sprede/klæbe middel.

Reglone er hurtig regnfast, så allerede 10 minutter efter behandlingen vil svidningseffekten være indtruffet. Effekten af Reglone vil kunne ses efter 1-3 uger afhængigt af vejrforholdene.

Doseringer

Anvend 1,8-2,0 l Reglone pr. ha mod tuer af alm. rapgræs og store planter af enårig rapgræs. Spildkorn af byg kan klares med 0,8-1 l Reglone pr. ha. Hvedespildkorn kræver 1,5 l Reglone pr. ha og efterfølgende kommer frost.

Er engrapgræsset svagt udviklet og derfor mere følsomt over for afsvidning, bør doseringen være mellem 0,8 og 1,5 l Reglone pr. ha.

Mod svækket og småt enårig rapgræs kan doseringen nedsættes til 1,5 l pr. ha. Mod nyfremspirede planter er 1,0-1,2 l pr. ha tilstrækkeligt.

Kvalitetsfradrag for indhold af andre rapgræsser

Indhold af andre rapgræsser i engrapgræs er stærkt kvalitetsforringende. Der trækkes 5 pct. af afregningsprisen ved indhold af andre rapgræsser på 0,2-0,5 pct. og 10 pct. ved indhold over 0,5 pct.

Der findes en række kopiprodukter til Reglone. Ikke alle disse produkter har anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs beskrevet på etiketten. Kontroller derfor, at etiketteteksten er i overensstemmelse med behovet i din mark.