


Engrapgræsgalmyg.

FrøavlsINFO nr. 6, 2017

- Tjek for engrapgræsgalmyg
- Sæt fangbakker ud
- Mange birkepollen = galmyg flyvning

Det er tid til at holde øje med engrapgræsgalmyggens flyvning. En tommelfingerregel siger, at galmyggen flyver, når der er mange birkepollen i luften, og det vil der være i varmere vejr. I figuren nedenfor vises en risikovurdering baseret på graddage, der forudser flyvningen af galmyg. Kurven til venstre er 2017, og som det fremgår, havde vi lunt vejr i første halvdel af april, men kurven for graddage flader ud i det kolde vejr vi har haft i 2. halvdel af april måned. Klik på billedet og indtast dit postnummer, for at se den forventede flyvekurve for din lokalitet:



Engrapgræsgalmyggen lægger æg i frøstænglen. Larvernes gnav i frøstænglen vil senere medføre udbyttetab pga. golde/dårligt udviklede frø.

Risikoen for mange galmyg er størst i områder, hvor der år efter år dyrkes engrapgræs, så her bør man have særlig opmærksomhed på denne skadevolder. Ældre marker er mere udsatte end 1. års marker.

Fangbakker placeret i engrapgræsmarken er en stor hjælp til at følge flyvningen lokalt. En behandling med 0,15-0,2 l/ha Karate 2,5 WG kan beskytte engrapgræsplanten mod angreb i ca. 10 dage lidt afhængig af væksten i afgrøden. En behandling ved maksimal flyvning, omkring 1. maj, kan også have positiv effekt på næste års udbytte, da antallet af galmyg reduceres.

En opfølgende sprøjtning kan være aktuel, hvis der fanges mange galmyg i marken. Flyvninger af galmyg i slutningen af maj forventes ikke at kunne skade dette års høst af engrapgræs.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

			
Plastbakke med vand + en dråbe sulfo udsat i engrapgræsmark.	Masser af små galmyg fra fangbakke placeret i en 2. års engrapgræs. Ikke alle typer galmyg skader engrapgræs	Den rigtige engrapgræsgalmyg er behåret på vingerne og er lidt større end svampemyggen	Svampemyggen - laver ikke skade i engrapgræs