

Svampe og vækstregulering i engrapgræs.

FrøavlsINFO nr. 7, 2017

- Svampeangreb udvikler sig med varmen
- Vækstregulering især aktuel ved god vandforsyning og vækst
- Vækstregulering skal foretages i strækingsfasen

Svampebekæmpelse i engrapgræs

Vi er så småt begyndt at finde angreb af meldug- og rustsvampe i engrapgræs.

Svampebekæmpelse foretages ved begyndende angreb af meldug og rust specielt i plænetyper som Miracle, Greenplay, Julius, Conni og Geisha, som er de mest udsatte sorter.

Geronimo, Evora, Panduro og Lato kan dog også angribes. Særligt gunstigt svampevejr kan også udløse meldug og rustangreb i sorter som f.eks. Balin.

Meldug og rust kan udvikle sig stærkt, særligt i de korte sorter, hvor afstanden er kort fra blade til frøstand. Symptomer ses først, hvor der er læ, og hvor plantebestanden er kraftig. Svampeangreb giver størst skade, hvis afgrøden bliver tørkestresset.



Rust i engrapgræs

Der kan anvendes 0,15 l/ha Folicur EW 250 (ny) + 0,15 l/ha Amistar/Mirador ved begyndende angreb. Er der et større angreb i gang, hæves

doseringen. Pas især på rust. Også Folicur Xpert, Tilt, Orius, Bell, Ceando, Approach, Comet og Viverda er godkendt til engrapgræs. Skal frøgræshalmen opfodres må kun Amistar eller Orius anvendes.

Sprøjtning mod skadedyr og svampe kan evt. kombineres med Ariane FG S mod tidsler.

Vækstregulering

Vækstregulering er aktuel i engrapgræs i god vækst, hvor vandforsyningen er god.

Det er specielt i de lange fodersorter, at vækstregulering er aktuel. Hvis man har benyttet Monitor i ukrudtssprøjtning, kan vækstregulering evt. udelades (især i korte typer), da Monitor ofte reducerer strålægden.

Vækstregulering forhindrer tidlig lejesæd, og skårlægningen er nemmere og mere skånsom i en afgrøde, der ikke er gået i leje i alle retninger.

I spildsomme sorter som eksempelvis Balin, Lato, Chester og Oxford skal man være opmærksom på, at vækstregulering giver en mere stående afgrøde til høst, som øger risikoen for dryssespild, såfremt marken er vindudsat eller skårlægning sker efter det optimale tidspunkt.

I ikke-spildsomme sorter kan vækstregulering i velgødede marker hjælpe til at gøre afgrøden mere velegnet til direkte tærskning.

Vækstregulering kan ske med 0,25-0,4 l Moddus M pr. ha i strækingsstadiet i velgødede afgrøder i god vækst og med god vandforsyning.

En opfølgende behandling med 0,3 l Moddus M pr. ha kan blive aktuel i særligt kraftige afgrøder, hvis vandforsyningen er i top.

Husk at tilsætte spredeklæbemiddel til Moddus sprøjtningen.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF