

## Efter-høst opgaver i engrapgræs

FrøavlsINFO nr. 9, 2017

- **Afpudsning af stub**
- **Enårig- og alm. rapgræs, snegle, rust og starthjælp til svage udlæg**

Flereårsmarker skal snarest afpudses til en stubhøjde på 3-5 cm. Er afgrøden skårlagt med BCS er stubhøjden automatisk dernede. Skiveslåmaskinen er billigst og hurtigst til opgaven, men husk at knivene skal være skarpe.

1. års marker skal pudses hurtigst muligt efter høst af dæksæd til 5-6 cm's stubhøjde. I praksis skal kornstubbe ofte "modne" 14 dage før en slaglepudser kan slå stubben af, dog vil megen nedbør skørne på materialet.

Ca. 1. september og 1. oktober afpudses atter, men til en højde på 6-8 cm. Det er især aktuelt i 2.års marker og i 1. års marker hvor bladene begynder at hænge. I særlig frodige år, kan det i ældre marker blive nødvendigt at pudse igen i første halvdel i oktober.

### Nyfremspiret enårig og alm. rapgræs

Bekæmpelse af nyfremspiret enårig- og alm. rapgræs kan i efteråret fortages med Boxer og/eller Stomp CS. Men det er dyrt. Alternativt anbefales 0,1 l DFF pr. ha på fugtig jord, gerne i august, så snart de første nyfremspirede græsuksrudtsplanter kan ses. På enårig- og alm. rapgræs virker DFF kun som jordmiddel, så jorden må ikke være dækket af afklippet plantemateriale når der behandles.

0,02 Hussar OD + 0,5 olie pr. ha har effekt på etableret enårig rapgræs og små planter alm. rapgræs.

### Agil

Agil kan anvendes mod spildkorn og græsuksrudt med op til 0,12 l pr. ha i engrapgræs efter høst af dæksæd. Tilsæt max. 0,1 Lissapol/ha. Sprøjt så tidlig som muligt så snart spildkorn, rævehale og hejre er fremspiret. Pas på høje temperaturer. Ved 18°C bør der max. bruges 0,08 Agil pr ha. Ved 12°C kan der anvendes op til

0,12 l Agil pr. ha. Brug ikke Agil ved udsigt til over 20°C.

### Snegle

Det nedbørsrige sommervejr giver risiko for et rigtigt snegle-år, som vi allerede har set i mange hvidkløvermarker. Snegleproblemet kan også være massivt efter raps; men tjek alle udlæg for en sikkerheds skyld.

Der kan anvendes sneglekorn, jern(III)fosfat-granulat som f.eks. Ferramol/Sluxx. Genbehandl hvis sneglekornene bliver ædt inden for få dage. Den tidlige behandling sikrer, at engrapgræsset får fodfæste. Kør sneglemidlet ud om aftenen, så det ikke ædes af fugle først.

### Rust

Engrapgræs med N-mangel bliver ofte angrebet af rust. Vi ser ofte større effekt at tilføre kvælstof end at svampesprøjte.

Det er kun svage 1. års udlæg som betaler for svampesprøjtninger om efteråret. Folicur Xpert og den nye Folicur EW 250 er godkendt til mindre anvendelse mod rust om efteråret. Brug 0,15 - 0,3 Folicur EW 250.

### Gødskning

Svage udlæg efter vårbyg, ærter eller vintersæd skal hurtigst mulig efter høst hjælpes i gang med 30 - 40 kg N, så de små planter kan gro med det samme. Gødning hjælper også planterne til at være mindre modtagelige over for svampesydomme. Kraftige udlægsmarker kan vente med at få tilført kvælstof til midt i september.

Vi anbefaler at tilføre 45-60 kg N pr. ha. i 1. års marker efter hvidkløver og 60-80 kg N i marker udlagt i ærter, korn og til flerårsmarker.

Engrapgræs udlagt i vintersæd, splitgødskes med to gange 40 N pr. ha.

### Gødningsnorm til engrapgræs høst 2018:

Marktyper (Balin, Oxford, Lato): 160 kg N/ha  
Plænetyper (andre sorter): 170 kg N/ha

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF