

Anvendelse af Kerb i hundegræs

FrøavlsINFO nr. 1, 2017

- Kerb 400 SC er nu på baggrund af vores FrøavlsFORSØG godkendt til hundegræs.
- Kerb 400 SC må kun anvendes i hundegræs udlagt i dæksæd, fra midt i februar til 1. marts, med en dosis på 0,2 til 0,3 l/ha

Er der på nuværende tidspunkt meget enårig eller alm. rapgræs i hundegræsmarken er eneste mulighed for bekæmpelse en anvendelse af Kerb 400 SC. Det er kun i marker eller områder med en betragtelig bestand af ukrudtsarterne, at behandling er tilrådeligt. Vurdering af vejrforholdene på sprøjtetidspunktet er vigtig, da der er risikoen for skade på afgrøden. Behandling i en kold periode med lav jordtemperatur sammen med store mængder nedbør, forstærker virkningen, og dermed også en eventuel skade på afgrøden.

Forsøg med Kerb 400 SC

DLF har i 2015 og 2016 udført forsøg med Kerb 400 SC i hundegræs. Forsøgene viser at det ved korrekt anvendelse er muligt at reducere bestanden af alm. rapgræs, uden at det går ud over udbyttet. Der har i gennemsnit over to års forsøg ikke været udbyttenedgang for for behandling sidst i februar med 0,2 eller 0,4 l Kerb 400 SC pr. ha.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Du kan læse mere om DLF forsøg med Kerb 400 SC i [ProduktionsDATA](#) og [FrøavlsFORSØG 2016/2017](#) side 17.

Virkemåde

Kerb 400 SC optages og virker gennem rødderne. Derfor vil udsprøjtning på en dag med fugtigt vejr fremme nedtrængningen i jorden og dermed også virkningen. Påvirkningen af hundegræs vil være størst i et svækket/svagt udlæg, da roddybden er reduceret og Kerb 400 SC virker stærkest øverst i jorden.

Anbefaling:

- Kerb 400 SC anvendes hvor der er en stor bestand af alm. rapgræs
- Der anvendes 0,2-0,3 l Kerb 400 SC pr. ha ultimo februar

Restriktioner

- Kerb 400 SC's godkendelse i hundegræs er til mindre anvendelse, hvilket betyder at midlet benyttes på eget ansvar
- Sprøjteføren må maksimalt behandle 6 ha pr. dag
- Halm må efterfølgende ikke anvendes til opfodring
- Brugsvejledning kan downloades [her](#)