

Reglone i rødsvingel og hundegræs

FrøavlsInfo

- Vintertid er tid til Reglone
- Frost øger effekten
- Vær klar til at rykke ud

Reglone i rødsvingel og hundegræs

Reglone kan anvendes mod væselhale i rødsvingel og generelt mod græsukrudt i hundegræs når frøafgrøderne er gået af vækst i december/januar.

I begge arter er der givet en off-label godkendelse i Reglone på hhv. på 0,5 l Reglone pr. ha + spredeklæbemiddel i rødsvingel og 1,0 l Reglone pr. ha i hundegræs.

I rødsvingel må Reglone kun anvendes i områder af marken med udbytte-reducerende forekomst af væselhale og kun i flerårs marker, dvs. ingen anvendelse i 1. års rødsvingel.

I hundegræs gælder tilsvarende, - kun anvendelse i områder af marken med udbytte-reducerende forekomst af græsukrudt eller spildkorn. Godkendelsen gælder her også 1. års marker

Find vejledningerne til mindre anvendelse på [Middeldatabasen](#).

Virkningsbetingelser af Reglone

Den bedste effekt af Reglone opnås ved sprøjtning om formiddagen i klart vejr, gerne efter en frostperiode. Reglone er et kontaktmiddel, så der skal anvendes en relativ stor vandmængde, mindst 250-400 l vand pr. ha, laveste vandmængde hvis der er meget dug. Rim på bladene vil nedsætte effekten. Frost efter behandlingen vil øge effekten på ukrudtet.

Husk at tilsætte 0,1 l Lissapol pr. 100 l vand

Reglone optages hurtigt i bladene og hovedparten af midlet vil være optaget i løbet af 10 minutter efter behandlingen.

Er det svagt frostvejr på behandlingstidspunktet kan der tilsættes 10 - 12 pct. flydende gødning til sprøjtevæsken for at undgå is i dyserne. I så fald undlades sprede/klæbe middel.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF