

Ukrudtsbekæmpelse i hybridrajgræs

FrøavlsINFO nr. 4, 2017

- Mulighederne for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt er mange
- Vælg ukrudtsmiddel efter effekt på problemukrudt og pris

Det er nu tid til at artsbestemme tokimbladet ukrudt i frøgræsmarken, for at få valgt den løsning, der bedst kan klare problemerne. I marker udlagt i renbestand er det ofte nødvendigt at påbegynde ukrudtsbehandlingen tidligt i foråret, alt efter hvordan behandlingen i efteråret har virket. Primus/Saracen indeholder udelukkende aktivstoffet Florasulam. Catch og Starane XL indeholder Florasulam i blanding med et andet aktivstof. Blandinger er en fordel i forhold til resistens. Nedenfor er udvalgt fire løsninger til forskellige situationer:

Primus

0,05 - 0,075 l/ha Primus + 0,05 - 0,07 l/ha DFF

Primus er aktuel i frøgræsmarken mod kamille, burre, snorre, valmue, raps og fuglegræs. Tilsæt DFF hvis ærenpris, tvevand og agerstedmoder er et problem.

Catch

0,4 - 0,6 l/ha Catch + 0,05 - 0,07 l/ha DFF

En løsning med Catch giver en god ukrudtsbekæmpelse. Catch har problemer med agerstedmoder og ærenpris, og derfor kan der med fordel tilsættes DFF for at forstærke virkningen.

Ariane FG S og Primus

1,5 - 2,5 l/ha Ariane FG S + 0,05 l/ha Primus

Ariane FG S kan anvendes i 1. års marker udlagt i korn med op til 2,5 l/ha, og i ældre marker kan anvendes op til 3,5 l/ha. Ariane FG S er særlig aktuel, hvor der er tidsler i frømarken. Temperaturkravet er mindst 12°C. Kombinationen af Ariane FG S og Primus er en all-round løsning mod frø- og rod ukrudt sidst i april/først i maj. Bemærk, at Ariane FG S ikke må bruges i hybridrajgræs udlagt i renbestand.

Starane XL

1,5 l/ha Starane XL

Er storkenæb og sejrenæb hovedproblemet, er Starane XL en god mulighed. Temperaturkravet er på 15°C, hvilket ofte gør at behandling må trækkes til maj.

Følgende midler herunder er omfattet af off-label eller minor use godkendelser: DFF, Primus, Starane XL og Catch. Vejledningen for de enkelte midler kan hentes på [Middeldatabasen](#).

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF