

Udlæg af hybrid rajgræs i renbestand

FrøavlsINFO nr. 7, 2017

- **Såning af nyudlæg i renbestand**
- **Gødskning af nye udlæg**

Hybrid rajgræs sås normalt fra sidst i august til først i september.

Erfaringerne viser, at der er færre problemer med sneskimmel og rajgræsmosaik i de efterårsudlagte arealer, som udbyttmæssigt normalt er fuldt på højde med de forårsudlagte arealer.

Tilberedning af såbed

Såbedets beskaffenhed er af stor betydning for fremspiringen, men også for at undgå generende konkurrence fra spildkorn eller andet spildfrø, er det vigtigt, at tilberedningen af såbedet udføres korrekt.

Er forfrugten korn, bør der pløjes, så spildkornet ikke generer græsset i løbet af efteråret. Dette gælder også, når der er tale om vårbyg. For selv om vårbyg normalt vil fryse væk om vinteren, vil det konkurrere kraftigt med græsset i efteråret med deraf uoprettelig skade til følge.

Ved pløjningen skal der tages højde for, at forplovne får det afskrællede materiale ned i bunden af furen, så kernerne ikke kan spire frem.

Umiddelbart efter pløjningen pakkes jorden grundigt. Selve opharvningen skal være så øverlig

som muligt for ikke at trække spild-kerner op og for at sikre tilpas sådybde i god fugtig jord.

En god pakning af jorden mindsker også risikoen for senere snegleangreb.

Udsædsmængde

Planternes kortere udviklingsperiode ved såning i renbestand medfører en mindre buskning med deraf færre frøstængler pr. plante. Derfor bør udsædsmængden øges med ca. 20 pct. i forhold til udlæg i dæksæd, men stadig skal udsædsmængden afstemmes efter sortens frøstørrelse.

Som udgangspunkt anbefaler vi 12 kg pr. ha i de tetraploide sorter og 10 kg pr. ha i diploide sorter. Sådybde 2-3 cm.

Gødskning

Til høst 2018 er kvælstofnormen for hybrid rajgræs 170 kg pr. ha, hvis der udlægges i renbestand. Kvælstofnormen er 140 kg N pr. ha for marker udlagt i dæksæd

For at sikre en hurtig og tilstrækkelig udvikling af planterne, kan der ved såning i renbestand tilføres en mindre mængde kvælstof.

Ved såning i september er det tilrådeligt at give kvælstofmængde på 25-30 kg N pr. ha ved såning.

Gødningen kan tilføres som NPK eller en ren kvælstofgødning.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF