

Ukrudtsbekæmpelse i ital. rajgræs

FrøavlsINFO nr. 4, 2017

- Primus/Saracen, Starane XL, Catch og DFF aktuel nu i frømarkerne
- Ariane FG skal vente på højere temperaturer

Tokimbladet ukrudt i frømarken

Der er ved at komme god vækst i såvel afgrøde som ukrudt. Der er flere gode muligheder mod ukrudt i foråret.

Primus/Saracen er aktuel nu i frøgræsmarken mod kamille, burresnerre, valmue, raps og fuglegræs. Anvend 0,05-0,075 l pr. ha + sprede/klæbemiddel ved tidlige behandlinger. Ved senere anvendelse og dermed større ukrudt, anvendes 0,1-0,12 l pr. ha. + sprede/klæbemiddel.

Tilsæt evt. 0,05 l pr. ha DFF/Legacy 500 SC/Diflanil 500 SC mod ærenpris, stedmoder og tvetand.

Starane XL kan også anvendes nu med op til 1,5 l pr. ha. Er god mod storkenæb og raps mfl. Også her kan man med fordel tilsætte 0,05 l DFF som ved Primus. Der skal være 15°C for optimal effekt.

Catch kan anvendes nu med 0,6 l pr. ha. Den meget bredt virkende og bl.a. et godt valg i marker med storke- og hejrenæb samt tidsler. Også her kan man med fordel supplere med DFF, hvis der er et behov for dette.

Ariane FG S kan anvendes i 1. års marker udlagt i korn med op til 2,5 l pr. ha. I ældre marker kan anvendes op til 3,5 l pr. ha. Ariane FG S er særlig aktuelt hvor der er tidsler i frømarken. Dagtemperaturkrav mindst 15°C samt gode vækstforhold.

Ariane FG S + Primus

Kombinationen af 1,5 l pr. ha Ariane FG S + 0,05 l pr. ha Primus er en all-round løsning mod frø- og rodukudt. Foretages behandlingen sidst i april/først i maj, vil man opnå en god effekt på tidsler.

Følgende midler herunder er omfattet af off-label eller minor use godkendelser: DFF, Primus, Starane XL og Catch. Vejledningen for de enkelte midler kan hentes på [Middeldatabasen](#).

Ital. rajgræs udlagt i renbestand efteråret 2016

I marker hvor en behandling af nyfremspiret ukrudt er nødvendig, kan **Primus** og **DFF** anvendes nu som beskrevet ovenfor. DFF må dog kun anvendes én gang pr. vækstsæson.

Starane XL kan anvendes i doseringen 1,2-1,5 l/ha.

Catch kan anvendes i doseringen 0,6 l/ha, som ovenfor specielt mod tidsler. Husk også her, at det ikke er muligt af fodre halm op, der er behandlet med Catch.

Det er ikke tilladt at anvende **Ariane FG S** i marker, der er udlagt i renbestand året før.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF