

Kvælstofnormer til markfrø høst 2018

AUGUST 2017

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

[Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018](#)

Frøart	Oprindelig N-norm	Vejledende N-mængder		Ny N-norm
	2016/2017	Efterår	Forår	2017/2018
	Kg / ha			
Alm. rajgræs	170	0-40	140-170	170
Alm. rajgræs efterårsudlagt, 1. års	210	0-40	140-170	200
Italiensk rajgræs	125	0-40	90-120	125
Italiensk rajgræs efterårsudl. 1. års	165	0-40	90-120	155
Hybrid rajgræs	140	0-40	110-140	140
Hybrid rajgræs, efterårsudl. 1. års	180	0-40	110-140	170
Westerwoldisk rajgræs	116	0	90-120	125
Timote og knoldrottehale	110	0-30	30-110	110
Hundegræs	200	50-60	120-130	200
Engsvingel	120	30-40	60-80	120
Bakkesvingel	150	60-80	50-70	150
Rødsvingel lange udl.	150	60-80	50-70	150
Korte og uden udløbere	150	60-80	50-70	150
Rajsvingel, festulolium	160	0-40	130-160	160
Rajsvingel efterårsudlagt	200	0-40	130-160	190
Strandsvingel	200	60-80	100-130	200
Krybhvene og alm. hvene	120	45-60	50-60	120
Alm. rapgræs	130	30	70-100	130
Engrapgræs marktype	160	60-80	70-85	160
Engrapgræs plænetype	170	60-80	75-90	170
Engrapgræs efter kløver	160/170	60-80	60-85	160/170

N-normerne til græsfrø til høst 2018 er uændrede, dog er N-normer til efterårsudlagte rajgræsarter samt rajsvingel reduceret med 10 kg N pr. ha i forhold til 2016/17.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF