

Såning af rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 3, 2017

- **Nyudlæg i ærter eller byg**
- **Udlægget spirer bedst og hurtigst når jorden er varmet lidt op**
- **Udlægget bliver bedst når både byg og rødsvingel sås på dobbelt rækkeafstand**

Udlæg af rødsvingel

Rødsvingel lykkes bedst på lermuldede jorder, men kan også dyrkes på de lidt lettere jordtyper. Humusjorder er ikke egnede til dyrkning af rødsvingel.

Et godt resultat starter med etableringen

Udlæg her i foråret kan ske i vårbyg eller i ærter.

Den normale udsædsmængde er 5-8 kg udsæd pr. ha. Højeste mængde i sorter uden udløbere og/eller ved mindre bekvemt såbed. Sådybden bør være 1,5 - 2 cm. Ved dybere såning spirer frøet ikke.

Det er vigtigt, at frøet placeres i fugtig og lun jord. Det tager 27 dage for halvdelen af rødsvingel at spire frem ved 5°C, men kun 12 dage, hvis jorden er 8°C.

Udlæg i ærter

Udlæg af rødsvingel i ærter er velegnet for alle typer af rødsvingel.

Ved såning af ærter og rødsvingel hver for sig, bør der tromles inden såning af rødsvingel.

Udlæg i vårbyg

Vælg så vidt mulig en stråstiv vårbygssort (maltbyg) med lav tendens til aks - og strå nedknækning, www.sortinfo.dk. Det er

afgørende at byggen står op til høst, og som hovedregel skal udlægsmarken vækstreguleres. Byggen skal ikke gødes for kraftigt og anvender man placeret gødning til vårbyg ved såning, styrker det udlægget at tildele 25-30 kg N pr. ha på overfladen, så græsset også får gavn af gødningen.

Rækkeafstand og såudstyr

Såning af både dæksæd og frø på dobbelt rækkeafstand er den bedste udlægsmetode.

På de fleste såmaskiner er det muligt med påbygget frøsåkasse, at så udlæg og korn med hver anden tragt og placere frørækkerne mellem kornrækkerne. Slangerne føres fra frøsåkassen ned i de bageste tragte, så frøet sås med de bageste tragte og kornet med de forreste tragte. Sådybden kan reguleres ved at korte/forlænge topstangen, eller slække de bageste tragte. Dette system fungerer rigtig godt i praksis og giver gode og sikre udlæg.

Under tørre såbedsforhold anbefaler vi at tromle straks efter såning.

Ukrudtsbekæmpelse ved såning

Bekæmpelse af enårig rapgræs i rødsvingel er mulig med anvendelse af DFF umiddelbart efter såning. En behandling med 0,1 l pr. ha DFF på fugtig jord umiddelbart efter såning og eventuel tromling, giver god effekt på enårig rapgræs. For at undgå skade på rødsvingel skal frøet være placeret i en dybde på 1,5 - 2 cm, og frøene skal være dækket af jord, ellers vil DFF kunne hæmme fremspiringen af udlægget.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF