

Ukrudtsbekæmpelse i rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2017

- Tokimbladet ukrudt i frømarken
- Spildkorn og agerrævehale
- Bladsvampe

I marker med højt ukrudtstryk, er det oftest nødvendigt at starte ukrudtsbehandlingen tidligt i foråret. Nedenfor er udvalgt fem løsninger til forskellige situationer:

0,075 l Primus/Saracen + 0,05 l DFF pr. ha

Denne løsning er aktuell nu, hvor der er mange kamiller, agerstedmoder, rød-tvetand og ærenpris.

0,8 l pr. ha Zyper

Et nyt interessant middel mod bl.a. storkenæb, hundepersille, hejrenæb, valmuer, kamille, burresnerre og pileurt. Ukrudtsarter som i dag optræder hyppigere i frømarkerne. Temperaturkravet er reletivt lavt, så en behandling med Zyper er aktuell fra nu af.

0,6 l Catch + 0,05 l DFF pr. ha

Catch giver en god ukrudtsbekæmpelse, men den mangler lidt styrke på kornblomst, agerstedmoder og ærenpris. Derfor kan der med fordel tilsættes DFF for at forstærke virkningen på de nævnte arter. Denne løsning er aktuell midt i april.

1,5 l pr. ha Starane XL

Mod storkenæb og hejrenæb er Starane XL et godt alternativ. Temperaturkravet er på 10-15°C, hvilket ofte gør, at behandling må trækkes til slutningen af april/først i maj. Løsningen er relativ dyr.

1,5 - 2,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha

Ariane FG S kan anvendes med op til 2,5 l/ha i første års marker udlagt i korn. I ældre marker kan anvendes op til 3,5 l/ha. Ariane FG S er

særlig aktuell, hvor der er tidsler i frømarken. Temperaturkravet er på mindst 15°C. Kombinationen af Ariane FG S og Primus/Saracen er en god all-round løsning mod frø- og rod ukrudt. Løsningen er effektiv men dyrere end de øvrige.

Følgende midler herunder er omfattet af off-label eller minor use godkendelser. Vejledningen for de enkelte midler kan hentes ved at klikke på midlet: [DFF](#), [Primus](#), [Starane XL](#), [Catch](#), [Primera Super](#), [Foxtrot](#) eller på [Middeldatabasen](#).

0,5 l Agil + 0,125 l spredeklæbemiddel pr. ha

Spildkorn og agerrævehale, der ikke er bekæmpet i efteråret, og som har konkurrencemæssig betydning i frømarken, bekæmpes bedst i april, inden det bliver for kraftigt. Begge dele vil ofte nå at blive for kraftigt, hvis det først skal bekæmpes sammen med grove græsser i maj. Spildkorn og agerrævehale kan bekæmpes/hæmmes med 0,5 l Agil pr. ha. Bemærk, der må i alt max anvendes 0,8 l/ha Agil pr vækstsæson.

Bladsvampe

I nogle rødsvingel marker ser vi ind imellem en del meldug. Disse angreb er forbigående og forsvinder normalt af sig selv i løbet af et par uger. Bladpletsvampe kan undertiden forekomme i kraftige angreb, og nye forsøg tyder på, at der i nogle tilfælde kan være merudbytter for en svampebekæmpelse i maj, såfremt afgrøden er generet af bladpletsvampe.

Størst merudbytte i forsøg er opnået ved anvendelse af 0,5 l Bell + 0,375 l Comet Pro pr. ha midt i maj.

De virksomme stoffer i disse midler er epoxiconazol, boscalid og pyraclostrobin. Disse stoffer findes i en færdig formulering i midlet Viverda, der er godkendt i frøgræs.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF