

Grove græsser i rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 7, 2017

- Agil og Focus Ultra mod kvik og grove græsser i maj

Afgrøderne gror kun langsomt i det kolde forårsvejr, og det trækker ud med sprøjtningerne. Bekæmpelse af grove græsser vil være aktuelt indenfor de kommende to uger. Vækstregulering er omtalt i [FrøavlsINFO nr. 6](#).

Bekæmpelse af kvik og grove græsser

Afregningsprisen reduceres med 10 pct. ved fund af 1 frø af grove græsser i renvareanalysen. Grove græsser er: Kvik, rajgræs, engsvingel, blød hejre og hundegræs.

Kvik og grove græsser kan bekæmpes med Agil eller Focus Ultra tilsat 0,5 l pr. ha Dash.



Rødsvingel behandlet med Focus Ultra. Det visne græs er rajgræs, der er effektivt bekæmpet med Focus Ultra. Blød hejre er groet igen og står med frøstængler.

Focus Ultra + Dash har den bedste effekt over for rajgræs, som er den hyppigst forekommende grove græs i analyserne. Normalt er en dosering på 1,2-1,5 l Focus Ultra pr. ha nok. Agil 100 EC er off-label godkendt i rødsvingel til forårsanvendelse mod græsukrudt. Agil 100 EC er godkendt til mindre anvendelse med i alt 0,8 l pr. ha + spredklæbemiddel. Agil har forholdsvis bedst effekt på blød hejre.

Det er vigtigt ikke at behandle for tidligt ved bekæmpelse af grove græsser. Nogle arter, som

eksempelvis alm. rajgræs og blød hejre, kan være i stand til at skyde igen og udvikle spiredygtige frø inden høst, hvis der går for lang tid fra behandling til høst. Undtagelsen er, hvis der skal bekæmpes agerrævehale, hvilket vi omtalte i [FrøavlsINFO nr. 5](#).

Focus Ultra og Agil 100 EC kan kombineres, men Focus Ultra er kun godkendt til anvendelse én gang pr. vækstsæson. Hvis der eksempelvis er anvendt Agil mod spildkorn om efteråret, kan der anvendes Focus Ultra og/eller Agil 100 EC mod grove græsser om foråret.

Vær særlig opmærksom på markkanterne og områder med dårlig afgrødekongurrence, da de største problemer med græsukrudt, specielt hejre, ofte findes her. Det kan være hensigtsmæssigt at øge doseringen af græsukrudtsmidler i de yderste meter.

Blandinger på eget ansvar

Sidste år så vi - under meget tørre vækstforhold - i nogle tilfælde for kraftig effekt på rødsvingel planterne, hvor vækstregulerings- og græsmidler blev udbragt sammen i én sprøjtning. I FrøavlsFORSØG har vi undersøgt effekten på frøudbyttet ved at blande Moddus M og CCC med græsmidler. Forsøgene har ikke vist skadevirkninger af at blande midlerne, når rødsvingel er velforsynet med vand. I nogle tilfælde forøger blandingen af Moddus M + CCC med Focus Ultra + Dash endda virkningen af vækstreguleringen med merudbytte til følge. **Konklusion:** Bland ikke midlerne, hvis afgrøden er stresset af høje temperaturer og vandmangel.

Etiketten på Focus Ultra angiver, at der skal være mindst en uge mellem behandling med midlet og en vækstregulering. Blanding af vækstreguleringsmidler med græsmidler, sker derfor på eget ansvar.

Der skal være 7-8 dage mellem en behandling med Ariane FG S sprøjtning og Agil/Focus Ultra. Halmen må ikke opfodres, hvis der er sprøjtet mod grove græsser.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF