

Gødskning til rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 11, 2017

- Sidste afpudsning
- Gødskning af rødsvingel

Rødsvinglen er mange steder groet kraftigt til i det våde efterår vi har haft i år. Og flere marker er pudset flere gange allerede. Den sidste afpudsning foretages nu i ca. 10 cm's højde. Efter sidste afpudsning skal alt materiale være findelt og må ikke ligge som et lag ovenpå afgrøden.

Gødskning

Rødsvingel gødes efter sidste afpudsning nu, 10.-15. oktober. Der gødes med 70 - 75 kg N pr. ha. Efter udlæg i ærter eller hvidkløver nedsættes

mængden til ca. 50 kg N pr. ha.

Ved normale fosfor- og kalital anvendes ren kvælstofgødning. Ved meget lave tal kan med fordel anvendes NPK-gødning. Svovl behøver man ikke at tilføre om efteråret.

Kvælstofnormen til rødsvingel høst 2018 er 150 kg N pr. ha.

Gylle kan anvendes når fordelingen er præcis og det nøjagtige kvælstofindhold kendes. Der kan regnes med 100 pct. udnyttelse af gyllens indhold af ammoniumkvælstof. Husk at gyllen skal være udbragt inden 15. oktober i græsfrømarker.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF