

Høst af rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 8, 2017

- Tidligste marker høstklar i slutningen af uge 27
- Tærsk skånsomt hvis der er væselhale

De tidligste sorter blomstrede først i juni, og bestøvningen af rødsvingel markerne blev generelt overstået i løbet af en uges tid.

Ud fra blomstringstidspunktet i rødsvingel skal høsten begynde i uge 28. Men hold især øje med de tidlige og spildsomme sorter, som især findes i gruppen uden udløbere. Fra blomstring til direkte høst går der ca. 35 dage. Der er 10-14 dage mellem høst af de tidligste og de sildigste sorter. Du kan finde tidligheden af din sort på vores [hjemmeside](#).

Høstmetode

Høst af rødsvingel foregår for langt den største dels vedkommende direkte på roden. Rødsvingel er generelt ikke særlig spildsom. En undtagelse herfra er marker med tidlige sorter oftest sorter uden udløbere, som står på vindudsatte arealer. Her kan der undertiden ske en del dryssespild, hvis der er kraftig blæst i den modne afgrøde lige før høst.

Det rigtige tidspunkt for direkte høst er, når den røde farve er gået af, og marken er blevet gulbrun. På dette tidspunkt vil der være under 20 pct. vand i frøene. I de mindre spildsomme sorter vil den optimale vandprocent være 15-16 pct. ved direkte tærskning.

Skårlægning er en nødløsning, men kan komme på tale, hvis marken er meget tvemoden. Skårlægning skal foretages en uges tid før direkte høst. På dette tidspunkt har afgrøden stadig en rødlig farve.

Vær opmærksom på at fremmede græsser ofte findes i hjørnerne og i den yderste markkant, hvorfor man bør undlade at høste den yderste halve meter med. Vær også opmærksom på forekomst af væselhale. Stærkt forurenede områder tærskes ikke.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Gode råd til høstarbejdet

*Undersøg bag mejetærskeren, at der ikke spildes frø over soldkassen eller i halmen.

* Sørg for at soldene er belastet så ens som muligt. Det er vigtigt at materialet kommer jævnt fordelt ind i maskinen, således at cylinder/rystere/rotorer og solde belastes ens hele tiden.

* Tjek varen i tanken. Er der afskallede frø tærskes der for hårdt. Er der mange topkud og dobbelt frø tærskes der måske for lempeligt.

I tilfælde, hvor marken er forurennet med væselhale, skal der tærskes lempeligt, således at stakken på væselhalen forbliver intakt. Det letter frarensningen på frørenseriet.

Rumvægt

Som rettesnor vil en normal råvarerumvægt i rødsvingel være 1,75-1,9 kg/10 l, hvilket i mange sorter vil svare til et rensesvind på 15 -18 pct. I enkelte småfrøede sorter med særligt tungt frø kan rumvægten uden problemer komme op over 2,2 kg/10 l.

Efterbehandling

Straks efter høst, samme dag, skal frøet på tørreriet. Start med kold luft og afslut med opvarmet luft, hvis det er nødvendigt for at få afgrøden tørret færdigt til 11 pct.

Tørreluften bør aldrig opvarmes mere end 5 - 6°C for at sikre en jævn ensartet nedtørring med minimal risiko for overtørring.

Afslut tørringen med at køle frøet ned.

Beluft frøet en gang om ugen de første fem uger efter afsluttet nedtørring og derefter køling, når muligheden gives.