

Efterårsbehandling af rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 9, 2017

- Efterårsbehandling i frø- og udlægsmark
- Kvælstof til svage udlæg

Efterårsbehandling forud for 1. høstår

Når dæksæden er høstet og halmen fjernet, er afpudsning af stubben det første der skal ske.

Det er meget vigtigt at de nye rødsvingel planter får optimale betingelser til at buske sig. Den proces fremmes, ved at afpudse dæksædens stub i 4 - 5 cm højde hurtigst mulig.

Afpudsningen reducerer stubbens skyggevirkning, så der kan komme mest mulig lys ned til de små planter. Afklipping af lange slaskede blade stimulerer ligeledes planterne til at sætte nye friske blade og sideskud.

Det er en fordel at sætte så lav stub som muligt med mejetærskeren. Er der afsat høj stub, kan det blive nødvendigt at det afklippede materiale rives sammen og fjernes. Der må ikke ligge mere materiale tilbage end hvad der kan få jordkontakt og forsvinde mellem udlægsplanterne.

Til svage udlæg anbefales at tilføre 30 kg N/ha straks efter høst.

Rødsvingel efter 1. høstår

Rødsvingelhøsten er overstået, og i nogle marker er halmen fjernet, mens halmen i andre marker stadig ligger på marken. Afbrænding er stadig aktuel og en vigtig foranstaltning forud for 2. høstår i rødsvingel. Vi ser de største merudbytte for afbrænding i sorter med korte udløbere og dernæst sorter med lange udløbere.

Er der lang stub eller meget genvækst, kan det være nødvendigt at underskære genvæksten og lade den ligge og tørre et par dage. Derefter kan afbrænding af halm og afpudset materiale foretages. Det er vigtigt at halmen er spredt

jævnt over hele arealet, så marken bliver sort efter afbrændingen.

Opstår der sår i marken efter afbrænding, vil væselhale have frit spil til at spire frem. Har du konstateret væselhale i sin 1. årsmark, fraråder vi afbrænding.

Afpudsning og afgræsning

Hvis frømarken ikke er afbrændt, er det vigtigt, at der pudes helt i bund, gerne ned til 2 - 3 cm's højde, umiddelbart efter afgrøden er høstet og halmen fjernet. Denne afpudsning foretages bedst med en slagleklipper. Skiveslåmaskinen er også god til at slå i bund, men skiveslåmaskinen lægger det afklippede materiale oven på rødsvingelplanterne, og det bevirker, at materialet har svært ved at blive omsat. Første afpudsning følges op med afpudsninger et par gange i løbet af efteråret efter behov. Der må ikke være mere materiale, end det kan forsvinde ned mellem planterne og omsættes inden vinteren. Er der for meget materiale, er det nødvendigt at rive det sammen og fjerne det.

Afgræsning med får kan være et udmærket alternativ til mekanisk afpudsning. Her er det stadig vigtigt, at gammel stub er afbrændt eller slået af straks efter høst. Vær opmærksom på, at der er tilstrækkelig mange får, ca. 30 stk./ha og anvend gerne sribegræsning, så fårene får gjort arbejdet færdigt, inden de flyttes videre.

Sen afgræsning må ikke efterlade græsset kortere end 7 - 8 cm's højde den 1. november.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF