

Ukrudtsbekæmpelse i rajsvingel

FrøavlsINFO nr. 4, 2017

- Mulighederne for bekæmpelse af to kimbladet ukrudt er mange, så valget må gå efter effekt på problemukrudt og pris

Det er nu tid til at artsbestemme tokimbladet ukrudt i frøgræsmarken, for at få valgt den løsning, der bedst kan klare problemerne. I marker udlagt i renbestand er det ofte nødvendigt at påbegynde ukrudtsbehandlingen tidligt i foråret, alt efter hvordan behandlingen i efteråret har virket.

Primus/Saracen indeholder udelukkende aktivstoffet Florasulam. Catch og Starane XL indeholder også Florasulam i blanding med et andet aktivstof. Blandinger er en fordel i forhold til resistens. Nedenfor er udvalgt tre løsninger til forskellige situationer:

Løsning med Catch

0,6 l/ha Catch + 0,05 l/ha DFF

En løsning med Catch giver en god ukrudtsbekæmpelse. Catch er ikke så stærk på Agerstedmoder og Ærenpris, og derfor kan der med fordel tilsættes DFF for at forstærke virkningen.

Løsning med Ariane FG S og Primus

1,5 l/ha Ariane FG S + 0,05 l/ha Primus

Ariane FG S kan anvendes i 1. års *marker udlagt i korn* med op til 2,5 l/ha. I 2. års marker kan Ariane FG S anvendes op til 3,5 l/ha. Er særlig aktuel, hvor der er tidsler i frømarken. Temperaturkrav mindst 10-12°C. Kombinationen af Ariane FG S og Primus er en all-round løsning mod frø- og rodukrudt. Er god ved en sen behandling og sprøjtningen udsættes til sidst i april/først i maj. Ariane FG S må IKKE anvendes i rajsvingel udlagt i renbestand

Løsning med Starane XL

1,5 l/ha Starane XL + 0,05 l/ha DFF

Er storkenæb og hejrenæb et stort problem og man er sent ude, er der en mulighed i Starane XL. Temperaturkravet er optimalt 15° C. Der kan tilsættes DFF mod ærenpris og agerstedmoder. Bemærk at DFF kun må anvendes én gang pr. vækstsæson.

Følgende midler herunder er omfattet af off-label eller minor use godkendelser: DFF, Primus, Starane XL og Catch. Vejledningen for de enkelte midler kan hentes på [Middeldatabasen](#).

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF