

Efterårsbehandling af rajsvingel

FrøavlsINFO nr. 7, 2017

- Lav et godt såbed
- Kør med DFF lige efter såning

Såning i renbestand kan ske frem til 10. september, og frøudbyttet i renbestand er fuldt på højde med udlæg i vårbyg. Vær opmærksom på snegleangreb på de små planter.

Tilberedning af såbedet

Såbedets beskaffenhed er af stor betydning for fremspiringen af rajsvingel, men også for at undgå generende konkurrence fra spildkorn eller andet spildfrø, er det vigtigt, at tilberedningen af såbedet udføres korrekt.

Er forfrugten korn, bør der pløjes, så spildkornet ikke generer græsset i løbet af efteråret. Dette gælder også, når der er tale om vårbyg. For selv om vårbyg normalt vil fryse væk om vinteren, vil det konkurrere kraftigt med græsset i efteråret med deraf uoprettelig skade til følge.

Ved pløjningen skal der tages højde for, at forploveene får det afskrællede materiale ned i bunden af furen, så kernerne ikke kan spire frem.

Umiddelbart efter pløjningen pakkes jorden grundigt, og selve opharvningen skal være så øverlig som muligt for ikke at trække spildkerner op og for at sikre tilpas sådybde i god fugtig jord. En god pakning af jorden mindsker også risikoen for senere snegleangreb.

Udsædsmængde

Planternes kortere udviklingsperiode ved såning i renbestand medfører en mindre buskning med deraf færre frøstængler pr. plante. Derfor bør udsædsmængden øges med ca. 20 pct. i forhold til udlæg i dæksæd.

Som udgangspunkt anbefaler vi 8-10 kg pr. ha og en sådybde på 2-3 cm.

Gødskning

N-normen er 190 kg pr. ha til høst 2018, når der udlægges i renbestand.

Ved såning ind i september er det tilrådeligt at udbringe 25-30 kg N pr. ha ved såning.

Gødningen kan tilføres som NPK eller en ren kvælstofgødning.

Ukrudtsbekæmpelse i rajsvingel udlagt i renbestand

For at få en effekt på enårig rapgræs anvendes mellem 0,1-0,15 l DFF pr. ha, udsprøjtet under gode fugtighedsforhold. [DFF](#) er godkendt til mindre anvendelse i rajsvingel.

Ukrudtsbekæmpelse i rajsvingel udlagt i vårbyg

Der er ikke de store muligheder for at bekæmpe ukrudt om efteråret i rajsvingel. Det er også sjældent nødvendigt på grund af den kraftige vækst.

Puds stubben i udlægsmarken

Hvis kornet er høstet med lang stub anbefaler vi at afpudse stubben efter høst, når man kan køre uden at lave spor i marken.

Hvis frøudlægget er tilmeldt som MFO, er der nu indført restriktioner på afpudsning. Det er tilladt at afpudse dæksædsstubben lige efter høst, og der må gerne tages slæt eller afgræsses. Men man må ikke afpudse græsset og lade materialet blive liggende. Dette gælder frem til MFO periodens afslutning.

Udlægsmarker af rajsvingel er sjældent svage, men hvis de forekommer, kan der med fordel tilføres 25-30 kg N pr. ha for at sætte gang i væksten.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF