

Såning af strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 3, 2017

- Udlæg i ærter og byg er en sikker metode
- Strandsvingel skal sås i 2-3 cm dybde, ikke drysses ud

Strandsvingel lykkes bedst på lermuldede jorder i god kultur. Sandmuldede jorder er mindre egnede til frøproduktion af strandsvingel, da udbyttet på sådanne jorde er væsentlig lavere i tørre år.

Der udsås 6-8 kg strandsvingel pr. ha. Der tilstræbes en plantebestand på 100-125 planter pr. m², men hvis planterne er jævnt fordelt, er 50-60 planter pr. m² tilstrækkeligt.

Såning af frøet skal ske straks eller helst samtidigt med såning af dæksæden. Frøet sås i 2-3 cm dybde, og det er vigtigt, at frøet får kontakt med fast og fugtig jord.

Tromling sker straks efter såning, så jordens kapillær effekt sikrer fugtighed til frøet.

Udlæg i vårbyg

Vælg så vidt mulig en stråstiv vårbygssort (maltbyg) med lav tendens til aks- og strå nedknækning, www.sortinfo.dk. Byggen skal ikke gødes for kraftigt. Undgå lejesæd da det er den sikre død for udlægget. Anvender man placeret gødning til vårbyg ved såning, styrker det udlægget at tildele 25-30 kg N pr. ha til såbedet, så græsset også får gavn af gødningen.

Bekæmp enårig rapgræs, lige efter såning.

- 0,1 l DFF pr. ha
- Ved stor forekomst af enårig rapgræs 0,1 l DFF + Stomp CS 0,5 pr. ha

DFF og Stomp virker bedst ved udsprøjtning på fugtig jord. Det er vigtigt at frøet er sået, dvs. dækket med 1-2 cm jord, idet midlerne ellers kan skade fremspiringen af strandsvingelplanterne.

Rækkeafstand og såudstyr

Strandsvingel er en langsom starter, og såning af både dæksæd og frø på dobbelt rækkeafstand er nødvendigt. Etablering på dobbelt rækkeafstand resulterer i veletablerede rækker af både byg og udlæg, og sikrer optimal konkurrence over for enårig- og alm. rapgræs.

Etableres udlægget med frøsåkasse, føres slangerne fra frøsåkassen ned i de bageste tragte, så frøet sås med de bagerste tragte og kornet med de forreste tragte. Sådybden kan reguleres ved at korte/forlænge topstangen, eller slække de bageste tragte.

Udlæg i ærter

Markærter er en glimrende forfrugt til strandsvingel. Der udsås 55 ærteplanter pr. m².

Ved såning af ærter og strandsvingel hver for sig, bør der tromles inden såning af græsfrøet. Frøet kan evt. sås med en Nordsteen radsåmaskine, og skærtrykket justeres, så sådybden er 2-3 cm.

Bekæmp tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs når sprøjtesporene er synlige.

0,5 l Stomp CS + 0,4 l Fighter 480 pr. ha
Efter 14 dage:
0,5 l Stomp CS + 0,5 l Fighter 480 pr. ha
(Ved Basagran M75 anvendes 0,75 l pr. ha)

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF