

Ukrudtsbekæmpelse i strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2017

- Mulighederne for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt er mange
- Vælg ukrudtsmiddel efter effekt på problemukrudt og pris

Tiden er inde til at artsbestemme de tokimbladede ukrudtsarter i strandsvingel marken. I marker med højt ukrudtstryk, er det oftest nødvendigt at starte ukrudtsbehandlingen tidligt i foråret. Nedenfor er udvalgt fem løsninger til forskellige situationer:

0,075 l Primus/Saracen + 0,05 l DFF pr. ha

Denne løsning er aktuel nu, hvor der er mange kamiller, agerstedmor, rød-tvetand og ærenpris.

0,8 l Zyper pr. ha

Et nyt interessant middel mod bl.a. storkenæb, hundepersille, hejrenæb, valmuer, kamille, burrenerre og pileurt. Ukrudtsarter som i dag optræder hyppigere i frømarkerne. Temperaturkravet er relativt lavt, så en behandling med Zyper er aktuel fra nu af.

0,6 l Catch + 0,05 l DFF pr. ha

Catch giver en god ukrudtsbekæmpelse, men den mangler lidt styrke på kornblomst, agerstedmoder og ærenpris. Derfor kan der med fordel tilsættes DFF for at forstærke virkningen på de nævnte arter. Denne løsning er aktuel midt i april.

1,5 l Starane XL pr. ha

Mod storkenæb og hejrenæb er Starane XL et godt alternativ. Temperaturkravet er på 10-15°C, hvilket ofte gør, at behandling må trækkes til slutningen af april/først i maj. Løsningen er relativ dyr.

1,5 - 2,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha

Ariane FG S kan anvendes med op til 2,5 l/ha i første års marker udlagt i korn. I ældre marker kan anvendes op til 3,5 l/ha. Ariane FG S er særlig aktuel, hvor der er tidsler i frømarken. Temperaturkravet er på mindst 15°C. Kombinationen af Ariane FG S og Primus/Saracen er en god all-round løsning mod frø- og rodukudt. Løsningen er effektiv men dyrere end de øvrige.

Følgende midler herunder er omfattet af off-label eller minor use godkendelser. Vejledningen for de enkelte midler kan hentes ved at klik på midlet: [DFF](#), [Primus](#), [Starane XL](#), [Catch](#), [Primera Super](#), [Foxtrot](#) eller på [Middeldatabasen](#).

Mod græsukrudt: 0,8 l Primera S eller 0,5 l Foxtrot + 0,125 l spredeklæbemiddel pr. ha

Med Primera Super og Foxtrot har vi mulighed for at bekæmpe vindaks, agerrævehale, flyvehavre og alm. rapgræs i strandsvingel.

Vær specielt opmærksom i ældre frømarker, hvor problemet med alm. rapgræs ofte er størst. Der skal behandles sidst i april ved gode vækstbetingelser og 15-20°C. Undgå at behandle strandsvingel, hvis den er tørkestresset, da det kan påvirke afgrøden for voldsomt.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF