

Vækstregulering og svampebekæmpelse i strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 6, 2017

- Vækstregulering aktuell i kraftige marker
- Svampebekæmpelse kan vente

Vækstregulering

Strandsvingel giver meget positiv udbytterespons for vækstregulering. Der anvendes normalt 0,8 l/ha pr. ha Moddus M/Trinex/Cuadro 25 EC i maj i perioden fra strækningsstadiet frem til begyndende skridning.

I kraftige marker med højt N-niveau og fodertyper af [strandsvingel](#) kan der suppleres med Moddus Start nu. Denne behandling skal følges op af den normale vækstregulering medio maj.

Anbefaling:

- Som udgangspunkt anbefaler vi en vækstregulering med 0,8 l Moddus M eller tilsvarende produkt pr. ha ved begyndende skridning i midten af maj.
- I kraftige velgødede marker kan man supplere denne behandling med 0,5 l Moddus Start eller 0,75 l Medax Top nu, når de første knæ kan mærkes.

Bemærk at den maksimale dosering er 0,8 l pr. ha af ét produkt, så derfor anvendes to forskellige Moddus-produkter, hvis der er behov for mere end 0,8 l pr. ha.

Moddus-produkterne Moddus M, Trinex, Cuadro 250 EC/NT, Moxa og Moddus Start indeholder 250 g pr. l af aktivstoffet Trinexapac-ethyl, mens Trimaxx indeholder 175 g pr. l.

Det er kun tilladt at opfodre vækstreguleret frøgræshalm, hvis der er behandlet med Moddus M eller Moddus Start til og med stadie 33.

Ved anvendelse af Moddus er det vigtigt, at afgrøden er velgødet, gode vækstforhold og vandforsyning, samt dagtemperaturer over 12-15 grader.

Svampebekæmpelse i strandsvingel

Meldugbekæmpelse i strandsvingel har i forsøgende ikke vist den store lønsomhed. Angreb af meldug i strandsvingel udvikler sig hurtigt, og kan blive så kraftigt at marken støver af meldug. Normalt forsvinder angrebet lige så hurtigt som det kom, også uden brug af svampemiddel.

I forbindelse med en tidlig vækstregulering skal der derfor normalt ikke medtages et svampemiddel.

Fra begyndende skridning og frem til blomstring kan der behandles med 0,2-0,4 l Bell + 0,15 l Comet Pro/0,1 l Comet pr. ha. Bell eller Ceando er især aktuell, hvis der er bladpletsvampe i afgrøden. Dosering er 0,5-0,75 l/ha Bell eller Ceando uden blandingspartner. Blanding af svampemidler med Moddus kun i afgrøder velforsynet med vand.

Bemærk at opfodring kun er tilladt ved anvendelse af svampemidlerne Orius, Amistar/Mirador og Comet Pro/Comet.



Kraftig udviklet strandsvingel Kora den 27. april 2017.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF