

Anvendelse af Kerb i strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 1, 2017

- Kerb 400 SC er eneste mulighed for at reducere en bestand af enårig rapgræs efter etablering af strandsvingel
- Kerb 400 SC må anvendes i strandsvingel udlagt i dæksæd, sidst i februar i en dosis på 0,2 l pr. ha
- Interessen for Kerb 400 SC er størst i fine plænesorter i marker med stor forekomst af enårig rapgræs

Er der på nuværende tidspunkt meget enårig rapgræs i strandsvingel afgrøden, er eneste mulighed for bekæmpelse Kerb 400 SC. I kombination med anvendelse af Agil i efteråret eller Primera Super i foråret, kan Kerb også forøge effekten på andet græsukrudt. Det er kun i marker eller områder i marker med en betragtelig bestand af enårig rapgræs eller andet uønsket græsukrudt, at behandling er tilrådeligt. Vurdering af vejrforholdene på sprøjte-tidspunktet er vigtigt, da der er risiko for skade på afgrøden. Behandling i en kold periode med lav jordtemperatur forstærker virkningen, og forøger risikoen for skade på afgrøden.

Forsøg med Kerb 400 SC

DLF har i 2014-16 udført seks forsøg med Kerb 400 SC i strandsvingel. Forsøgene viser, at det ved korrekt anvendelse er muligt at reducere bestanden af enårig og alm. rapgræs, uden at det går ud over udbyttet. Der har i gennemsnit over tre års forsøg ikke været udbyttenedgang for behandling sidst i februar med 0,2 l Kerb 400 SC pr. ha.

Du kan læse mere om DLF forsøg med Kerb 400 SC i [ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG 2016/2017](#) side 13.

Virkemåde

Kerb 400 SC optages og virker gennem rødderne. Vent med udsprøjtning til jordtemperaturen er begyndt at stige efter vinteren, for at undgå skade på afgrøden. Kerb nedbrydes når jordtemperaturen stiger. Udsprøjtning på en dag med fugtigt vejr vil fremme nedtrængningen i jorden og dermed også virkningen.

Anbefaling:

- Kerb 400 SC anvendes hvor der er stor bestand af enårig rapgræs
- Der anvendes 0,2 l Kerb 400 SC pr. ha ultimo februar. Undgå overlap

Restriktioner

- Kerb 400 SC's godkendelse i strandsvingel er til mindre anvendelse, hvilket betyder at midlet benyttes på eget ansvar
- Sprøjteføreren må maksimalt behandle 6 ha pr. dag
- Halm må efterfølgende ikke anvendes til opfodring
- Brugsvejledning kan downloades [her](#)

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF