

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med bakkesvingel

FrøavlsINFO nr. 4, 2018

- Nyudlæg i ærter og vårbyg
- Opfølgning i vintersæd

Bekæmpelse af ukrudt i dæksæd

Nyudlæg i ærter:

Der sprøjtes med ca. 10-14 dages mellemrum med 2 x (0,5 l Stomp CS+ 0,4-0,5 l Fighter 480 pr. ha), eller 2 x (0,5 l Stomp CS + 0,75 l Basagran M75 pr. ha). 1. sprøjtning udføres, når ukrudtet er på kimbladsstadiet. 2. sprøjtning udføres, når nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet 10-14 dage efter.

Nyudlæg i vårbyg

Der er flere gode muligheder for at bekæmpe ukrudt i vårbyg med udlæg af bakkesvingel. Vælg en kombination af midler som passer til det ukrudt, der findes i marken.

0,2 l Buctril + 0,05 l DFF kombineret med 7,5 g Express SX pr. ha + har en god bred effekt.

Buctril og DFF kan anvendes på småt ukrudt og opfølgning kan ske med Express SX.

Der er flere andre gode løsninger til ukrudtsbekæmpelse i dæksæd, her kan nævnes 0,075 l Primus, 0,5 l Primus XL, 0,8 l Starane XL, 0,25-0,6 l Catch eller 0,5 l pr. ha Mustang Forte. Bemærk at dæksædshalm behandlet med Mustang Forte skal brændes, og at der er restriktioner i forhold til efterfølgende afgrøde. Mere uddybende info om anvendelse af Mustang Forte kan findes på etiketten, som kan hentes [her](#).

Bekæmp enårig rapgræs i dæksæden

Mod enårig rapgræs hæves doseringen af DFF til 0,1 l pr. ha.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

DFF virker bedst ved udsprøjtning på fugtig jord. Alternativt kan 0,5-1,0 l pr. ha Stomp anvendes. Det er vigtigt ved anvendelse af DFF eller Stomp, at græsfrøene er sået, dvs. dækket med mindst 1 cm jord, idet midlerne ellers kan skade.

Hussar OD må anvendes med 0,035 l pr. Ha, og **Hussar Plus OD** med 0,5 l/ha. Ud over en bred effekt mod bredbladet ukrudt, er der også effekt mod enårig rapgræs, vindaks og rajgræs.

Rodukrudt

MCPA kan anvendes mod rodukrudt som f. eks. tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha i vårbyggs stadie 30-39. Husk stor vandmængde.

Primera Super/Foxtrot kan anvendes mod flyvehavre, vindaks og alm. rapgræs med 0,8 l pr. ha.

Udlæg i vintersæd, opfølgning i foråret

Express SX anvendes mod nyfremspiret ukrudt med 7,5 g evt. i blanding med 0,05 l DFF eller med 0,3 l Starane pr. ha. Er der mange burrenerre eller kamille, kan 0,05- 0,075 l Primus eller 1,0 l Starane XL pr. ha også være en løsning. 0,75 l Mustang Forte pr. ha er velegnet mod frøukrudt og tidsler.

Hussar OD (0,05 l pr. ha + olie) eller **Hussar Plus OD** (0,07 l pr ha) kan anvendes mod enårig rapgræs, vindaks og alm. rajgræs samt bredbladet ukrudt. Mod alm. rapgræs kan 6 g **Monitor** pr. ha anvendes midt i april.

Primera Super/Foxtrot anvendes mod flyvehavre, agerrævehale og vindaks i dæksæden med 1,0 l pr. ha.

Topik kan anvendes mod agerrævehale, alm. rapgræs og vindaks med 0,4 l pr. ha frem stadie 29.

Lexus 50 WG kan anvendes med 10 g pr. ha mod agerrævehale, vindaks mm. frem til ukrudtets stadie 25.