

Ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering i bakkesvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2018

- Tokimbladet ukrudt
- Focus Ultra mod kvik og grove græsser
- Vækstregulering aktuel sidst i april

Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt

Er der anvendt Hussar mod enårig rapgræs er der sikkert ikke behov for yderligere ukrudtsbekæmpelse. Ellers kan en af følgende løsninger anbefales:

Catch er aktuel fra midten af april med 0,5-0,6 l/ha. Den er et godt valg i marker med storke- og hejrenæb samt tidsler. Midlet har god effekt mod kamille, burrenerre, valmue, raps og fuglegræs. Tilsæt evt. 0,05 l/ha DFF mod ærenpris, stedmoder og tvetand.

Starane XL er aktuel med op til 1,5 l/ha. Den er særlig god mod storkenæb og kræver 15 °C.

Ariane FG S kan anvendes i 1. års marker udlagt i korn med op til 2,5 l/ha. I ældre marker kan anvendes op til 3,5 l/ha. Særlig aktuelt hvor der er tidsler i frømarken. Dagtemperaturkrav mindst 12° C.

Kombinationen af **1,5 l/ha Ariane FG S + 0,05 l/ha Primus** er en god all-round løsning mod frø- og rodukrudt. Kan sprøjtningen vente til sidst i april/først i maj, kan man opnå en god effekt på tidsler.

Bekæmpelse af kvik og grove græsser

Afregningsprisen reduceres med 10 pct. ved fund af grove græsser i analysen. Grove græsser er kvik, rajgræs, engsvingel, blød hejre og hundegræs.

Der anvendes **1,5 l/ha Focus Ultra + 0,5 l/ha DASH** mod kvik og grove græsser sidst i april/først i maj.

Der skal være 7-8 dage mellem en hormon-sprøjtning og sprøjtning med Focus Ultra. Halmen må ikke opfodres, hvis der er sprøjtet med Focus Ultra.

Vækstregulering

Velgødede marker på kraftig jord har behov for vækstregulering for at opnå en større sikkerhed for en god bestøvning. Hvis der er tilført husdyrgødning, eller hvis der er gødet godt op ved forårsgødskningen, er vækstregulering ekstra vigtig.

Der skal ikke vækstreguleres i marker på de letteste jordtyper.

I bakkesvingel vækstreguleres sidst i april med 0,3-0,5 l/ha af Moddus Start, Moddus M, Cuadro eller Trimaxx.

Det er vigtigt, at der er gode vækstforhold, en veletableret afgrøde i god vækst, gode fugtighedsforhold og temperaturer på 12-15 grader.

Moddus Start, Moddus M og Cuadro har samme indhold af aktivstof. (250 g/l) Moddus Start er godkendt med 0,8 l/ha. Moddus M er off-label godkendt med 0,5 l/ha. Cuadro er godkendt med 0,8 l/ha (Minor use). Trimax er godkendt med 0,8 l/ha. (175 g/l aktivstof)
Opfodring af frøgræshalm er kun tilladt ved anvendelse af Moddus M frem til stadie 33.

Blandinger

Der er ikke på nogle vækstreguleringsmidlerne en blåstempling af blanding med Focus Ultra, så blanding sker derfor på avlers eget ansvar. Man kan forvente en forøget virkning af vækstreguleringen ved blanding med Focus Ultra + DASH.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF