

Vækstregulering og svampebekæmpelse i engsvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2018

- Vækstregulering aktuel nu
- Svampebekæmpelse

Det absolut bedste udgangspunkt for et godt udbytte er at engsvinglen står op ved blomstring. Det er også vigtigt, at engsvinglen står op i frøfyldningsperioden helt frem til skårlægning. Vækstregulering af engsvingel skal udføres under hensyntagen til afgrødens tilstand og vækst. Da engsvingel er en meget spildsom afgrøde, er det vigtigt at den bliver skårlagt, hvis afgrøden står op til høst.

Der kan i alt anvendes op til 0,8 l pr. ha Moddus Start + 0,8 l pr. ha Moddus M i stadie 31 - 48. Ved anvendelse af Moddus Start og Moddus M er det vigtigt, at vækstforholdene er gode, og at afgrøden er velforsynet med vand.



Første knæ er mærkbart mange steder, og vækstregulering er aktuelt fra stadie 31.

Første vækstregulering igangsættes i stadie 31, hvor første knæ kan findes på hovedparten af stænglerne. Anvend 0,4 l - 0,6 pr. ha Moddus Start.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

To til tre uger efter første behandling med Moddus Start, følges op med 0,5 - 0,8 l pr. ha Moddus M, højeste dosering i velgødede og kraftige marker med god vandforsyning.

Ved anvendelse af Moddus Start og Moddus M er opfodring af frøgræshalmen tilladt, såfremt afgrøden ikke er vækstreguleret efter stadie 33.

Sygdomme og skadedyr

Hvis der findes en del meldug i maj inden gennemskridning, bør afgrøden beskyttes med et svampemiddel.

En effektiv og billig meldugbekæmpelse opnås ved at anvende 0,25 l pr. ha Tilt 250/Bumper 25 EC. Oftest vil denne behandling falde sammen med første vækstregulering, og midlerne kan blandes.

Ved svampeangreb senere på vækstsæsonen, kan man f.eks. følge op med 0,4 l pr. ha Viverda, der har rigtig god effekt på rust- og bladpletsvampe. Denne behandling kan kombineres med 2. vækstregulering.

Aproach, Amistar, Orius og Comet Pro er ligeledes godkendt til svampebekæmpelse i engsvingel.

Er der begyndende angreb af lus, kan det være aktuelt - sammen med vækstreguleringen - at medtage 0,2 kg pr. ha Karate 2,5 WG, som er off-label godkendt i markfrø.

Frøgræshalm, der er behandlet med svampe- eller insektmidler må generelt ikke opfodres. Af ovenstående midler er kun Amistar en mulighed, hvis halmen skal opfodres.