

Hvad betyder tørken og varmen for frøafgrøderne?

FrøavlsINFO nr. 8, 2018

- Tørkestressede afgrøder
- Tidlig blomstring giver tidlig høst
- Risiko for tvemodenhed

Det er svært at forestille sig at markerne var godt og vel vandmættede og mere eller mindre snedækkede for 8 uger siden.

Maj 2018 vil indskrives i historiebøgerne som den varmeste og den mest solrige i 130 år. Med over 360 soltimer i maj 2018 har solen hver dag skinnet i over 11½ time!

Desværre har maj også været en tør måned, og selv om der i nogle områder er faldet nogle gode byger, er det generelle billede, at afgrøderne er sat under et voldsomt tørkestress de fleste steder.

Markerne boniterer kraftigt, og planterne ikke trække vand nok fra jorden.

Varmen giver også risiko for, at rustangreb i arter som engrapgræs og rajgræs kan udvikle sig hurtigt, så vær opmærksom og følg udviklingen i marken.

Antal dage fra bedste bestøvningsdag til skårlægning eller direkte høst

Art	Dage fra blomstring til skårlægning	Dage fra blomstring til direkte høst
Hvidkløver	25	28
Alm. rajgræs	33	38-40
Ital. rajgræs	30	35
Hundegræs	28	
Strandsvingel	24	28-30
Engsvingel	26	30-35
Rødsvingel	24	35
Bakkesvingel	24	35
Engrapgræs	21-25	30-35

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Jylland-Fyn: Tlf. 66 17 02 30

Sjælland-Lolland-Falster: Tlf. 57 66 07 34
www.dlf.dk

Bornholm: Tlf. 56 97 43 35

Tidlig blomstring giver tidlig høst

Bakkesvingel er afblomstret, engrapgræs er langt fremme i blomstringen og rødsvingel blomstrer på fuld kraft.

Hundegræs og ital. rajgræs har startet blomstringen og sågar i tidlige sorter af alm. rajgræs og strandsvingel ser vi begyndende blomstring.

Blomstringen er således ca. 8-10 dage tidligere end normalt, og vejrudsigten for den kommende tid viser stadig masser af sol og tørt vejr.

Det betyder at vi kan se frem til en tidlig høst. I tabellen viser vi de antal dage, der normalt går fra blomstring til høst, men vær opmærksom på at tørt og varmt vejr vil afkorte perioden fra blomstring til høst.

Efter tabellen skal vi skårlægge de første engrapgræssorter omkring den 20. juni og høste rødsvingel i første uge af juli. Notér hvornår din frøafgrøde blomstrer og brug tabellen som rettesnor.

Tvemodenhed

De tørkestressede afgrøder skrider og blomstrer uens og over en lang periode. Det gælder især strandsvingel og alm. rajgræs. Derfor er der også risiko for at vi får nogle tvemodne afgrøder til høst, hvor det kan være svært at fastsætte det optimale høsttidspunkt.

