

Afpudsning af hvidkløver

FrøavlsINFO nr. 3, 2017

- Afpudsning er kun aktuel ved god vandforsyning
- For sen afpudsning koster udbytte
- Rivendel har sjældent behov for afpudsning

Efter et par uger med varme og god vækst begynder de første blomsterhoveder at komme frem i hvidkløver. Det er nu, der skal tages stilling til, om hvidkløveren skal afpudses.

I tætte afgrøder med god vandforsyning vil en afpudsning af bladene give mere lys til vækstpunkterne på de overjordiske udløbere. Mere lys stimulerer dannelsen af blomsterhoveder. En afpudsning betyder derfor, at blomstringen bliver mere koncentreret.

Bladvæksten er begrænset i de småbladede sorter som Rivendel, så her bør man være mere tilbageholdende med afpudsning, især hvis vandforsyningen er begrænset.

Afpudsning skal ske, når de første blomsterknopper er synlige. Vent IKKE til de første hvide hoveder er fremme.

I marker med kraftig bladmasse og god vandforsyningen er afpudsning aktuel nu. Tilstræb en afpudsning højde på 10-12 cm. Kraftige marker eller delområder i marken kan eventuelt afpudses to gange om nødvendigt.

Mængden af afpudset materiale må ikke være større, end det hurtigt kan omsættes. Alternativt kan det afpudsede materiale fjernes fra marken. Afpudsning skal ske med udsigt til tørt vejr. Afpudsning er en fordel for især plænetyper af engrapgræs, der er udlagt i hvidkløver, da det forbedrer engrapgræssets konkurrenceevne. Afpudsning af pletter med græsukrudt som f.eks. alm. rapgræs og blød- og gold hejre vil reducere frøspredning til engrapgræsafgrøden næste år.

Afgræsning med får

I en del marker løser man afpudsningen med får. Ud over hvidkløveren tager de også fat på ukrudtsplanter, eksempelvis kamille og spildraps, som for de flestes vedkommende bliver gnavet helt i bund. Fårene skal tages fra marken inden de laver skade på blomsterknopperne, normalt i sidste uge af maj.

Weed-wiper i kløver

Er der meget ukrudt, kan en afpudsning også være en fordel. En anden mulighed er at bekæmpe ukrudtet med weed-wiper, men det kræver så, at man undlader afpudsning.

F. eks kan kamille og skræppe, og i nogen grad tidsel, bekæmpes ved hjælp af weed-wiper. Der kan godt anvendes weed-wiper, selv om der er udlagt engrapgræs, og hvor de frøbærende stængler er oppe over hvidkløveren. Når blot engrapgræsset er godt etableret, er det kun få planter, der skades, selvom toppen rammes af weed-wiperen.

Bestøvning

Der skal som minimum udsættes to velfungerende bistader pr. ha. Sørg for at det er store og stærke bifamilier, der betales for. På køligere lokaliteter, ved større marker og hvor der ikke er en stor forekomst af vilde bestøvere, skal der flere stader til. Ved større arealer kan staderne med fordel placeres flere steder i marken.

Vent med at sætte bierne i marken til der er blomster i kløveren, som de kan trække på. Det sikrer, at bierne vænner sig til at blive i marken. Bestil allerede nu bier til næste års hvidkløver frømark. Det er i de kommende uger, at biavlerne skal forberede næste års bifamilier.

Husk at notere dato for hovedbestøvning.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF