

Ukrudtsbekæmpelse i rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 4, 2018

- Tokimbladet ukrudt i frømarken
- Spildkorn og agerrævehale
- Bladsvampe

I marker med højt ukrudtstryk, er det oftest nødvendigt at starte ukrudtsbehandlingen tidligt i foråret. Nedenfor er udvalgt fem løsninger til forskellige situationer.

Primus/Saracen + DFF

Denne løsning er aktuell nu, specielt hvor kamille er hovedproblemet. Sammen med DFF bekæmpes også agerstedmoder, ærenpris og rød tvetand.

0,075 l Primus/Saracen + 0,05 l DFF pr. ha

Zypar + DFF

Zypar har specielt god effekt på hundepersille, storkenæb og lægejordrøg, men bekæmper også de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter. DFF kan eventuelt tilsættes som nævnt ovenfor. Temperaturkravet er relativt lavt, så en behandling med Zyper er aktuell nu.

0,75 l Zypar + 0,05 l DFF pr. ha

Catch + DFF

Catch giver en god ukrudtsbekæmpelse, men den mangler lidt styrke på burrener og kornblomst. DFF kan eventuelt tilsættes som nævnt ovenfor. Denne løsning er også aktuell nu.

0,6 l Catch + 0,05 l DFF pr. ha

Starane XL

Mod storkenæb og hejrenæb er Starane XL en mulighed. Temperaturkravet er på 10-15°C, hvilket ofte gør, at behandling må trækkes til slutningen af april/først i maj. Løsningen er relativ dyr.

1,5 l Starane XL pr. ha

Ariane FG S + Primus/Saracen

Ariane FG S kan anvendes med op til 2,5 l/ha i første års marker udlagt i korn. I ældre marker kan anvendes op til 3,5 l/ha. Ariane FG S er særlig aktuell, hvor der er tidsler i frømarken.

Temperaturkravet er på mindst 15°C. Kombinationen af Ariane FG S og Primus/Saracen er en god all-round løsning mod frø- og rod ukrudt på det sene tidspunkt. Løsningen er effektiv men dyrere end de øvrige.

1,5 - 2,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha

Følgende midler herunder er omfattet af off-label eller minor use godkendelser. Vejledningen for de enkelte midler kan hentes ved at klik på midlet: [DFF](#), [Primus](#), [Zypar](#), [Starane XL](#), [Catch](#), eller på [Middeldatabasen](#).

Agil

Spildkorn og agerrævehale, der ikke er bekæmpet i efteråret, og som har konkurrencemæssig betydning i frømarken, bekæmpes bedst i april, inden det bliver for kraftigt. Begge dele vil ofte nå at blive for kraftige, hvis det først skal bekæmpes sammen med grove græsser i maj. Spildkorn og agerrævehale kan bekæmpes/hæmmes med 0,4 l Agil pr. ha. Bemærk at der i alt må anvendes 0,8 l pr. ha Agil pr. vækstsæson. Behandlingen følges op i maj med Focus Ultra.

0,4 l Agil pr. ha + 0,1 l sprklmid. pr. 100 l vand

Bladsvampe

I nogle rødsvingel marker ser vi ind imellem en del meldug. Disse angreb er forbigående og forsvinder normalt af sig selv i løbet af et par uger. Bladpletsvampe kan undertiden forekomme i kraftige angreb, og nye forsøg tyder på, at der i specielt i ikke afbrændte marker med meget plantemateriale kan være merudbytter for en svampebekæmpelse i maj, såfremt afgrøden er generet af bladpletsvampe.

Størst merudbytte i forsøg er opnået ved anvendelse af 0,5 l Bell + 0,375 l Comet Pro pr. ha midt i maj.

De virksomme stoffer i Bell og Comet Pro findes i Viverda, der er godkendt i frøgræs. Viverda anvendes med 0,4 l pr. ha.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF