

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med udlæg af rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2018

- Udlæg i ærter og vårbyg
- Opfølgning, udlæg i vintersæd

Udlæg i ærter

Der anvendes Stomp CS + Fighter 480 med 10 - 14 dages mellemrum:

1. sprøjtning, 0,4 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS pr. ha, udføres, når det første ukrudt er på kimbladsstadiet uanset størrelsen på ærter og udlæg.

2. sprøjtning, 0,5 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS pr. ha, foretages, når nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet. Ærter må tildeles maksimalt 0,9 l pr. ha Fighter 480 i split og 1,0 l pr. ha såfremt behandlingen ikke deles.

Ved anvendelse af Stomp CS skal rødsvingel frøene være dækket af mindst 1 cm jord.

Udlæg i vårbyg

Mod enårig rapgræs kan DFF anvendes med op til 0,1 l pr. ha umiddelbart efter såning på fugtig jord. Sørg for at rødsvingel frøene er dækket af mindst 1 cm jord for at undgå skade. Kommer der store nedbørsmængder umiddelbart efter behandling, kan rødsvingel skades af DFF.

Hussar OD må anvendes med 0,035 l pr. ha og Hussar Plus OD med 0,05 l pr. ha mod enårig rapgræs samt vindaks og rajgræs. Begge midler har bred effekt på tokimbladet ukrudt. Begge midler tilsættes 0,5 l olie pr. ha.

Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt

Hvis der er anvendt DFF lige efter såning, kan opfølgning ske med f.eks. Mustang Forte, Zypar, Catch, Starane XL og/eller Express SX.

7,5 g Express SX i blanding med enten 0,075 l Primus (specielt kamille) eller 0,5 l Zypar (specielt hundepersille og storkenæb) pr. ha, har bred effekt mod tokimbladet ukrudt.

Tidsler bekæmpes bedre med 0,4 - 0,6 l pr. ha Catch eller 0,5 l pr. ha Mustang Forte, sammen med Express. Tidslerne skal være godt fremme på behandlingstidspunktet.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Det er vigtigt at finde løsninger, der kombinerer flere virkemekanismer for at forebygge herbicidresistens. Hvis ikke der er anvendt DFF ved såning, kan der tilsættes 0,05 l pr. ha DFF til at forstærke effekten mod agerstedmoder, ærenpris og rød tvetand.

DFF må kun anvendes én gang pr. sæson. Produkter med aktivstofferne i Hussar og Express må ikke anvendes i samme vækstår. Uddybende info om anvendelse af Mustang Forte findes på [Middeldatabasen](#).

MCPA

MCPA anvendes mod rod ukrudt som f. eks. tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha i vårbyggens stadium 20-39. Bedst effekt ved min. 20°C, stor vandmængde og langsom fremkørselshastighed. Træk behandlingen til der er adskillige grønne blade på tidslerne.

Primera Super kan med 1,0 l pr. ha anvendes mod flyvehavre og agerrævehale frem til stadie 29.

Udlæg i vintersæd, forår

Express SX anvendes mod nyfremspiret ukrudt med 7,5 g pr. ha evt. i blanding med 0,05 l pr. ha DFF. Er der mange burrener eller store kamiller kan det suppleres med 0,75 l Zypar eller 0,75 l Starane XL pr. ha. 0,75 l pr. ha Mustang Forte er velegnet til frø ukrudt og tidsler.

Mod specielt enårig rapgræs anvendes i vinterbyg Hussar OD i doseringen 0,025 l eller Hussar Plus OD med 0,035 l + 0,5 l olie pr. ha. I hvede er doseringerne Hussar OD 0,05 l eller Hussar Plus OD 0,07 l + 0,5 l olie pr. ha. Af denne gruppe midler (Express SX, Trimmer, Nuance, Hussar) må man kun anvende ét af midlerne én gang pr. vækstår.

Mod agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs kan anvendes Topik 0,4 l pr. ha frem til stadie 29 eller Primera Super med 1 l pr. ha frem til stadie 39.