

Vækstregulering og svampebekæmpelse i strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 6, 2018

- Vækstregulering aktuel i kraftige marker
- Svampebekæmpelse kan vente

Strandsvingel giver meget positiv udbytterespons for vækstregulering. Der anvendes normalt 0,8 l pr. ha Moddus i maj i perioden fra strækningsstadiet frem til begyndende skridning.

I kraftige marker med højt N-niveau og fodertyper af [strandsvingel](#), kan det være en fordel at vækstregulere to gange.

Anbefaling:

- Som udgangspunkt anbefaler vi en vækstregulering med 0,8 l pr. ha Moddus M eller tilsvarende produkt ved begyndende skridning i midten af maj.
- I kraftige velgødede marker i god vækst og med god vandforsyning, kan man starte vækstreguleringen op ved begyndende strækningsvækst, når 2. knæ kan erkendes på 10 pct. af stænglerne. Anvend 0,5 l - 0,8 l pr. ha Moddus nu og juster doseringen ved næste behandling fra 0,4 - 0,8 l pr. ha af et Moddus produkt afhængig af afgrødens vandforsyning.

Bemærk at den maksimale dosering er 0,8 l pr. ha af et Moddus-produkt, så derfor skal der anvendes to forskellige Moddus-produkter, hvis der er behov for mere end i alt 0,8 l pr. ha.

Find en oversigt over godkendte vækstreguleringsmidler og deres indhold af aktivstoffer [her](#).

Det er kun tilladt at opfodre vækstreguleret frøgræshalm, hvis der ikke behandles senere end stadiet 33 med Moddus M eller Moddus Start.

Ved anvendelse af Moddus er det vigtigt, at afgrøden er velgødet, der er gode vækstforhold og god vandforsyning, samt dagtemperaturer over 15°C.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Svampebekæmpelse i strandsvingel

Meldugbekæmpelse i strandsvingel har i forsøgende ikke vist den store lønsomhed. Angreb af meldug i strandsvingel udvikler sig hurtigt, og kan blive så kraftige at marken støver af meldug. Normalt forsvinder angrebet igen, også uden brug af svampemiddel. I forbindelse med en tidlig vækstregulering skal der derfor normalt ikke medtages et svampemiddel.

Fra begyndende skridning og frem til blomstring kan der behandles med 0,2 - 0,4 l Bell + 0,15 l Comet Pro pr. ha. Bell er især aktuel, hvis der er bladpletsvampe i afgrøden. Dosering er 0,5-0,75 l pr. ha Bell uden blandingspartner.

Bland kun svampemidler med Moddus, i strandsvingel afgrøder der er velforsynet med vand.

Bemærk at opfodring af frøgræshalmen ikke er tilladt hvis der er anvendt svampemidler.



Strandsvingel Kora i god vækst den 24. april 2018