

Ukrudtsbekæmpelse i strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 4, 2018

- Mulighederne for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt er mange
- Vælg ukrudtsmiddel efter effekt på problemukrudt og pris

Tiden er inde til at artsbestemme de tokimbladede ukrudtsarter i strandsvingel marken. I marker med højt ukrudtstryk, er det oftest nødvendigt at starte ukrudtsbehandlingen tidligere i foråret. Nedenfor er udvalgt fem løsninger til forskellige situationer:

Primus/Saracen + DFF

Denne løsning er aktuel nu, specielt hvor kamille er hovedproblemet. Tilsæt DFF for at bekæmpe agerstedmoder, ærenpris og rød tvetand.

0,075 l Primus/Saracen + 0,05 l DFF pr. ha

Zypar + DFF

Zypar har særlig god effekt på hundepersille, storkenæb og lægejordrøg, men bekæmper også de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter. DFF kan eventuelt tilsættes som nævnt ovenfor.

0,75 l Zypar + 0,05 l DFF pr. ha

Catch + DFF

Catch giver en god ukrudtsbekæmpelse, men den mangler lidt styrke på burrenerre, kornblomst og store kamille. Denne løsning er også aktuel fra nu af. DFF kan eventuelt tilsættes som nævnt ovenfor, og en lille dosering af Primus, hvis kamillerne er blevet meget store.

0,6 l Catch + 0,05 l DFF pr. ha

Starane XL

Mod storkenæb og hejrenæb er Starane XL en mulighed. Temperaturkravet er på 10-15°C, hvilket ofte gør, at behandling må trækkes til slutningen af april/først i maj. Løsningen er relativ dyr.

1,5 l pr. ha Starane XL

Ariane FG S + Primus/Saracen

Ariane FG S kan anvendes med op til 2,5 l/ha i første års marker udlagt i korn. I ældre marker kan anvendes op til 3,5 l/ha. Ariane FG S er særlig aktuel, hvor der er tidsler i frømarken. Temperaturkravet er på mindst 15°C. Kombinationen af Ariane FG S og Primus/Saracen er en god all-round løsning mod frø- og rodukrudt på det sene tidspunkt. Løsningen er effektiv men dyrere end de øvrige.

1,5 - 2,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha

Følgende midler herunder er omfattet af off-label eller minor use godkendelser. Vejledningen for de enkelte midler kan hentes ved at klik på midlet: [DFF](#), [Primus](#), [Zypar](#), [Starane XL](#), [Catch](#), [Primera Super](#), [Foxtrot](#) eller på [Middeldatabasen](#).

Primera Super mod græsukrudt

Med Primera Super og Foxtrot har vi mulighed for at bekæmpe vindaks, agerrævehale, flyvehavre og alm. rapgræs i strandsvingel.

Vær specielt opmærksom i ældre frømarker, hvor problemet med alm. rapgræs ofte er størst. Der skal behandles fra midt i april ved gode vækstbetingelser og 15-20°C. Undgå at behandle strandsvingel, hvis den er tørkestresset, da det kan påvirke afgrøden for meget.

0,8 l Primera S pr. ha. + 0,1 l spredklæbemiddel pr. 100 l vand

Weedwiper

Det er muligt at låne en 12 m weedwiper til frømarker mod græsukrudt, korn, eller afvigende planter, der kan give problemer ved certificeringen, men det kræver en højdeforskel på mindst 15 cm mellem afgrøde og ukrudt.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF