

Etablering af strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 3, 2018

- Udlæg i ærter, byg og vårhvede er en sikker metode
- Strandsvingel skal sås i 2-3 cm dybde, ikke drysses ud

Strandsvingel lykkes bedst på lermuldede jorder i god kultur. Men også stiv lerjord egner sig, blot jordstrukturen er god. Derimod er sandmuldede jorder mindre egnede, da udbyttet reduceres, hvis afgrøden går tør for vand i vækstperioden, hvor frøene skal udvikles.

Brug en udsædsmængde på 6-8 kg strandsvingel pr. ha. Der tilstræbes en plantebestand på 100-125 planter pr. m², men hvis planterne er jævnt fordelt, er 50-60 planter pr. m² tilstrækkeligt.

Såning af frøet skal ske straks eller helst samtidigt med såning af dæksæden. Frøet sås i 2-3 cm dybde, og det er vigtigt, at frøet får kontakt med fast og fugtig jord.

Tromling sker straks efter såning, så såbedets kapillæreffekt sikrer fugtighed til frøet. Strandsvingel spirer ved forholdsvis lave jordtemperaturer.

Udlæg i vårbyg og i vårhvede

Vælg så vidt mulig en stråstiv vårbygssort (maltbyg) med lav tendens til aks- og strånedknækning, www.sortinfo.dk.

Byg og vårhvede skal ikke gødes for kraftigt, undgå lejesæd da det er den sikre død for udlægget. Anvender man placeret gødning ved såning, kan det styrke udlægget at tildele 25-30 kg N pr. ha af kvælstoffet oven på jorden, så græsset kan få fat i gødningen.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Bekæmp enårig rapgræs, lige efter såning

DFF virker bedst ved udsprøjtning på fugtig jord. Det er vigtigt at frøet er sået, dvs. dækket med mindst 2 cm jord, idet midlerne ellers kan skade fremspiringen. Brug 0,1 - 0,15 l DFF pr. ha

Rækkeafstand og såudstyr

Strandsvingel er en langsom starter, og såning af både dæksæd og frø på dobbelt rækkeafstand er nødvendigt. Etablering på dobbelt rækkeafstand resulterer i veletablerede rækker af både byg og udlæg, og sikrer optimal konkurrence over for enårig- og alm. rapgræs.

Etableres udlægget med frøsåkasse, føres slangerne fra frøsåkassen ned i de bagerste tragte, så frøet sås med de bagerste tragte og kornet med de forreste tragte. Sådybden kan reguleres ved at korte/forlænge topstangen, eller slække de bagerste tragte. Bedst er trykruller til at styre dybden.

Udlæg i ærter

Markærter er en glimrende forfrugt til strandsvingel. Der sås mellem 50 og 55 ærter pr. m². Ved såning af ærter og strandsvingel hver for sig, bør der tromles inden såning af græsfrøet. Frøet kan evt. sås med en Nordsten radsåmaskine, og skærtrykket justeres, så sådybden er 2-3 cm. Man kan hjælpe strandsvingel udlægget ved at udsprede 25 kg N pr. ha først i maj.

Bekæmp tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs på ukrudtets kimbladsstadiet, gerne i en splitbehandling:

- 0,5 l Stomp CS + 0,4 l Fighter 480 pr. ha
Efter 10-14 dage:
- 0,5 l Stomp CS + 0,5 l Fighter 480 pr. ha.