

Vækstregulering af hybrid rajgræs

FrøavlsINFO nr. 5, 2019

- **Vækstregulering skal få afgrøden til stå op ved blomstring, for herefter at gå i leje til modenhed**

Vækstregulering forudsætter, at afgrøden er velforsynet med kvælstof, og at vandforsyningen er i orden. Det gælder om at få afgrøden til at stå op, mens den blomstrer og herefter gå i leje for at undgå dryssespild.

Moddus-produkter

Vækstregulering skal i hybrid rajgræs normalt ske ved begyndende skridning med et middel, der indeholder trinexapac-ethyl som f.eks. Moddus M.

Der er efterhånden godkendt en del forskellige midler. Du kan se hvilke og til hvilke afgrøder de er godkendt [her](#).

Bemærk at den maksimale dosering af Moddus er 0,8 l pr. ha, så hvis der er behov for mere, må anvendes en kombination af Moddus og Medax Top.

Strategi 2019

Ved begyndende skridning vurderes marken. Man skal være opmærksom på kvælstofmængde, sort og vejrforholdene.

Udgangspunktet er, at der behandles med 0,5 - 0,8 l pr. ha Moddus M ved begyndende skridning.

Behandling mod svampe

I år har der været lidt mere angreb af svampesygdomme i rajgræs end normalt. Der ses dog ofte i maj en yderligere udvikling af svampeangreb i rajgræs, og det vil derfor være fornuftigt at medtage et svampemiddel, f.eks. 0,3 l Orius, Folicur Expert eller Bell pr. ha eller en kombination af disse.

Den vigtigste behandling mod rust og bladpletsvampe foretages ved begyndende blomstring. Mere om det i en senere frøavlsinfo.

Ved vækstregulering er det vigtigt, at der er gode vækstforhold og temperaturer over 12-15 grader.

Frøgræshalm må opfodres efter behandling med Moddus M, der er anvendt inden stadie 33.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF