

Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs

FrøavlsINFO nr. 4, 2020

- Mange gode muligheder for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt
- Den milde vinter har betydet at ukrudtet har groet godt til.

Det er nu tid til at få et overblik over ukrudtsproblemerne i frømarken, for at få valgt den bedste løsning til den aktuelle ukrudtsbestand. I nogle renbestandsmarker var det ikke muligt at færdes med sprøjten i efteråret, og her er ukrudtet vokset godt til. Derfor skal disse marker behandles tidligt. Primus/Saracen indeholder udelukkende aktivstoffet florasulam, og kan bruges tidligt.

0,075 l/ha Primus/Saracen + 0,05 l/ha DFF

Fælles for de fleste midler, der kan anvendes i foråret er en svaghed overfor agerstedmoder og ærenpris. Derfor tilsættes 0,05 l/ha DFF.

Catch, Starane XL, Mustang Forte og Zypar indeholder florasulam i blanding med et andet aktivstof, hvilket giver en bredere effekt. Samtidig er blandinger en fordel i forhold til resistens. Nedenfor er udvalgt fem løsninger til forskellige situationer.

0,75 l/ha Mustang Forte + 0,05 l/ha DFF

Mustang Forte bekæmper de fleste tokimbladede ukrudtsarter, og har samtidig også en sideeffekt på visse rodukruddarter. Mustang Forte må anvendes indtil stadie 32, og har nogle restriktioner i forhold til halmanvendelse og efterfølgende afgrøde.

Indgår der andre afgrøder end græs, korn, raps og majs, eller skal halmen sælges til andet end industri eller afbrænding, bør man sætte sig grundigt ind i restriktionerne.

0,6 l/ha Catch + 0,05 l/ha DFF

En løsning med Catch giver en god ukrudtsbekæmpelse, men bekæmpelsen af burrenerre, kornblomst, rodukrudd og raps er ikke på niveau med Mustang Forte. Oplagt løsning hvor Mustang Forte ikke er muligt.

0,75 l/ha Zypar + 0,05 l/ha DFF

I de sidste par år har Zypar været anvendt en del, og med godt resultat. Midlet har lidt bedre effekt end Catch på storkenæb, hejrenæb og rød tvetand. Kan anvendes ved lave temperaturer. Zypar må ikke bruges i renbestandsudlæg.

**2,5 l/ha Ariane FG S eller
1,5 l/ha Ariane FG S + 0,05 l/ha Primus**

Ariane FG S kan anvendes i 1. års marker udlagt i korn med op til 2,5 l/ha. I 2. års marker kan Ariane FG S anvendes op til 3,5 l/ha. Er særlig aktuell, hvor der er tidsler i frømarken. Temperaturkrav mindst 10-12°C.

Kombinationen af Ariane FG S og Primus er en all-round løsning mod frø- og rodukrudd. Er god ved en sen behandling og sprøjtningen udsættes til sidst i april/først i maj. Ariane FGS er det dyreste middel, men brug den, hvis tidsler er et problem.

Ariane FGS må ikke bruges i renbestandsudlæg.

1,5 l/ha Starane XL + 0,05 l/ha DFF

Er det Storkenæb og Hejrenæb der er hovedproblemet er der en god mulighed i Starane XL. Temperaturkravet er på 15°C, hvilket ofte gør at behandling må trækkes til sidst i april.

Følgende midler herunder er omfattet af off-label eller minor use. Vejledningen for de enkelte midler kan hentes her (Klik på midlet):

[DFF](#), [Mustang Forte](#), [Zypar](#) og [Catch](#)

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF