

Bladsvampe i alm. rajgræs, opfølgning

FrøavlsINFO nr. 8, 2020

- Afsluttende svampebehandling ved blomstring
- Sortrust elsker varme og tørre forhold

Foråret 2020 har budt på tørke mange steder, og der er områdevis en del marker med tørkeskader. Der er nu heldigvis kommet nedbør de fleste steder, men det kan ikke rette op på alle marker. Der har været angreb af kronrust i markerne og mange er behandlet i forbindelse med en vækstregulering. Bekæmpelse af kronrust anbefales ved 0,1 procent dækning. Meldug forekommer også i nogle marker, men anbefales kun bekæmpet indtil skridning.

Den vigtigste svampebehandling udføres ved blomstring som er i gang i de tidlige sorter og de øvrige sorter kommer indenfor de næste 14 dage afhængig af beliggenhed. Kronrust kan specielt udvikle sig kraftigt i den sidste del af vækstperioden, hvor angrebene i nogle tilfælde ses helt op på de øverste blade. Dette er nok en medvirkende årsag til, at det er de sene behandlinger op mod blomstring, der er de mest lønsomme.

Sortrust-risiko under varme forhold

I de senere år har vi set angreb af sortrust på nogle lokaliteter. Sortrust er en meget aggressiv og udbyttekrævende svamp som kan forventes,

specielt under varme og tørre forhold. Det er derfor en svampesygdom, vi skal være godt forberedt på.

Vær specielt opmærksom i rajgræs udlagt i renbestand, som er mere modtagelig for sortrust end rajgræs udlagt i vårbyg.



Bladpletsvamp

Net- og pletnekrose bekæmpes i fugtige år ved over 10 pct. angrebne planter indtil afsluttet blomstring.

Aktuelle midler

Til bekæmpelse af kronrust, bladplet og sortrust kan der anvendes omkring 0,5 l Bell eller 0,4 l Bell + 0,15 l Comet Pro eller 0,4 l Viverda pr. ha.

Skadedyr

Ved angreb af skadedyr som mider og lus kan en bekæmpelse være aktuel sammen med en kommende svampesprøjtning. Karate 2,5 WG er off-label godkendt til frøgræs.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF