

Ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs

FrøavlsINFO nr. 4, 2020

- Hussar OD eller Hussar Plus OD, god mod enårig rapgræs
- Ariane FG S, stærkt mod tidsler

Der har igen i år været rigtig god effekt af de tidligere Hussar behandlinger mod enårig rapgræs, selvom det har været koldt. Det vil dog i de fleste tilfælde være nødvendigt med en opfølgende behandling, se [FrøavlsINFO nr. 2](#). Tag gerne din frøavlskonsulent med på råd, når sprøjteplanen skal fastlægges.

I de korte engrapgræssorter kan en weedwiper hjælpe mod alm. rapgræs, hejre, kvik og andet ukrudt, der er højere end engrapgræsset. Resten må klares med håndlugning, pletsprøjtning eller fraskæring til høst. Kontakt din frøavlskonsulent, hvis du ønsker at låne en 12 m weed-wiper.

Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt

Har der tidligere været anvendt Hussar, vil der sjældent være behov for yderligere bekæmpelse af tokimbladet ukrudt, bortset fra skræpper og tidsler på et senere tidspunkt.

Primus har god effekt på kamille, burrenerre, valmue, raps og fuglegræs. Doseringen er 0,05-0,1 l pr. ha, store kamiller kræver 0,1 l pr. ha. Primus har også virkning på skræpper ved sprøjtning efter skræpperne har fået grønne blade gerne omkring 1. maj.

Catch har en bred virkning mod ukrudt herunder rodukrudt og valmuer. Doseringen er på op til 0,6 l pr. ha. Storkenæb bekæmpes rimeligt, når de behandles senest 20. april.

Zypar har specielt god effekt på hundepersille, storkenæb og lægejordrøg, men bekæmper også de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter bortset fra agerstedmoder, ærenpris. Anvend op til 1,0 l pr. ha.

Starane XL kan anvendes med op til 1,5 l pr. ha. Midlet har god effekt mod pileurt, burrenerre, skræpper og kamille.

Ovennævnte midler kan kombineres med 0,05-0,1 l DFF pr. ha, for at opnå bedre effekt mod agerstedmoder og i nogen grad ærenpris og tvetand. Den høje dosering anvendt i forbindelse med fugtig jord, kan også forhindre nyfremspiring af enårig rapgræs. DFF må kun anvendes én gang pr. vækstsæson.

Ariane FG S kan anvendes med op til 2,5 l pr. ha i 1. års marker udlagt i korn men må ikke bruges i 1. års marker udlagt i ærter/raps. I ældre marker kan anvendes op til 3,5 l pr. ha.

Ariane FG S er en dyr, men aktuell løsning, hvor der er tidsler i frømarken.

Agertidsler bekæmpes bedst i første halvdel af maj, men tidslerne skal være fremme igen efter en eventuel Hussar behandling. Dag temperaturen bør være over 15°C og gerne mere.

Bekæmpelse af rodukrudt

Skræpper, agertidsler og haremad starter væksten sent i foråret. Tidsler og skræpper er især et problem i engrapgræs efter hvidkløver. På nogle eksportmarkeder er der nul-tolerance over for skræpper i engrapgræs. Så skræpper skal altid bekæmpes 100 pct.

[Catch](#), [Zypar](#), [DFF](#), [Hussar OD](#) og [Hussar Plus OD](#) er godkendt til mindre anvendelse i engrapgræs.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF