

Svampe og vækstregulering i engrapgræs

FrøavlsINFO nr. 7, 2020

- Svampeangreb udvikler sig når varmen kommer
- Vækstregulering skal foretages i strækingsfasen
- Vækstregulering specielt i de lange typer

Svampebekæmpelse i engrapgræs

Vi har kun set svage angreb af meldug og rust svampe i engrapgræs, men rustsvampene findes nu i en god del af engrapgræsmarkerne. Vi forventer, at svampene bliver opformeret når det igen bliver varmere.

Svampebekæmpelse foretages ved begyndende angreb af meldug og rust i plænetyper, som Miracle, Greenplay, Julius, Conni og Geisha, der er blandt de mest udsatte sorter. Lato og Chester kan også angribes og i særligt gunstigt svampevejr kan også Balin angribes, så bekæmpelse bliver aktuel.

Meldug og rust kan udvikle sig stærkt, særligt i de korte sorter, hvor afstanden er kort fra blade til frøstand. Symptomer ses først, hvor der er læ, og hvor plantebestanden er kraftig. Svampeangreb giver størst skade, hvis afgrøden samtidig bliver tørkestresset.



Rust i engrapgræs

Der kan f.eks. anvendes 0,3 l Folicur pr. ha ved begyndende angreb. Er der et større angreb i gang, hæves doseringen. Pas især på rust.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Rustangreb på stængel og i frøtoppen kan koste stort udbyttetab.

Også Bell, Ceando, Comet Pro og Viverda er godkendt til engrapgræs.

Sprøjtning mod skadedyr og svampe kan evt. kombineres med Ariane FG S mod tidsler.

Vækstregulering

Vækstregulering foretages i engrapgræs i strækingsvækst, men kun når vandforsyningen er god.

Det er specielt i de lange fodersorter, at vækstregulering kan blive aktuelt. Vækstregulering forhindrer tidlig lejesæd, og skårlægningen er nemmere og mere skånsom i en afgrøde, der ikke er gået i leje i alle retninger.

I spildsomme sorter som eksempelvis Balin, Lato, Chester og Oxford skal man være opmærksom på, at vækstregulering giver en mere stående afgrøde til høst, som øger risikoen for dryssespild. Derfor bliver det meget vigtigt at få skårlagt afgrøden til tiden.

I ikke-spildsomme sorter kan vækstregulering i velgødede marker hjælpe til at gøre afgrøden mere velegnet til direkte tærskning, men korte sorter vækstreguleres kun, hvis der er rigeligt vand til rådighed.

Vækstregulering kan ske med 0,25 op til 0,8 l Moddus pr. ha i strækingsstadiet i velgødede afgrøder i god vækst og med god vandforsyning, i de tidligste afgrøder fra nu. Tørkeramte afgrøder vækstreguleres ikke. Er vandforsyningen knap anvendes den laveste dosering. Den høje dosering vil man normalt udsprøjte af 2 gange med 14 dages mellemrum.

Bland aldrig Moddus med Hussar og bland kun Moddus med svampemiddel, hvis afgrøden er rigeligt forsynet med vand.

Bemærk at den maksimale dosering er 0,8 l pr. ha af ét Moddus produkt.

Husk at tilsætte spredeklæbemiddel til Moddus sprøjtningen.