

1. års engrapgræs, bortsprøjtning af hvidkløver

FrøavlsINFO nr. 9, 2020

- MCPA, både før og efter kløverhøst
- Zypar til bortsprøjtning af kløver i engrapgræs
- Hussar mod kløver og enårig rapgræs
- Snegle

Bortsprøjtning af hvidkløver forud for engrapgræs

I de hvidkløvermarker, hvor der er udlagt frøgræs til høst 2021, skal kløvergenvæksten sprøjtes væk, så snart kløveren er kommet godt i vækst. I de først tærskede hvidkløvermarker vil det være indenfor den nærmeste tid.

Zypar er godkendt til mindre anvendelse til bortsprøjtning af hvidkløver i engrapgræs med 1,0 l pr. ha eller to gange 0,5 l pr. ha i august.

MCPA er godkendt til mindre anvendelse i engrapgræs til bortsprøjtning af kløver med 1,0 l pr. ha. Tjek på [Middeldatabasen](#) hvilke handelspræparater af MCPA, der er godkendt. Anvendelse må ske frem til den 1. september.

Midlerne må kun anvendes én gang pr. vækstsæson 2020/21. MCPA anvendt til nedvisning før kløverhøst tæller med i vækstsæsonen 2019/20.

En behandling til bortsprøjtning af hvidkløver er ofte ikke tilstrækkeligt. Derfor skal der udføres en supplerende behandling i efteråret med 0,02 l

Hussar OD eller 0,05 l Hussar Plus OD pr. ha. Bemærk, at Express og Hussar ikke må bruges i samme afgrøde, og Express derfor ikke er interessant.

Til bortsprøjtning af hvidkløver i engrapgræs anbefaler vi 1 l Zypar eller 1,0 l MCPA pr. ha senest 31. august, efterfulgt af 0,02 l Hussar OD eller 0,05 l Hussar Plus OD pr. ha. 10-14 dage senere. Der tilsættes 0,5 l Renol pr. ha. Hussar må senest anvendes den 15. september.

MCPA behandlingen vil også have en sideeffekt mod agertidsler, når disse er i god vækst.

Hussar vil foruden effekten på genvækst og nyfremspiret kløver også have effekt på småt enårig rapgræs.

Snegle

Vi har ikke haft større problemer med snegle de seneste år, men i fugtigt vejr kan de blive et problem i gen.

Mod snegle kan der anvendes sneglekorn, jern(III)fosfat-granulat som f.eks. Ferramol /Sluxx. Hvis sneglekornene bliver ædt inden for få dage, skal der genbehandles. Kør sneglemidlet ud om aftenen, så det ikke ædes af måger m.m. inden sneglene får muligheden for at indtage måltidet.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF