

Etablering af engsvingeludlæg

FrøavlsINFO nr. 2, 2020

- Etablering af udlæg
- Gødskning
- Ukrudtssprøjtning ved såning

Udlæg af engsvingel

Den mest anvendte udlægsmetode er udlæg om foråret med vårbyg som dækafrøde. Der anvendes 7-9 kg udsæd pr. ha afhængig af såbedets kvalitet. Vårhvede er også velegnet som dæksæd til engsvingel, men vælg en dyrkningsstrategi så lejesæd undgås.

Da engsvingel ofte sås på den svære jord, som kan være ubekvem, er det vigtigt at udvise stor omhu ved såningen, og i sådanne tilfælde anvendes den høje udsædsmængde.

Den absolut bedste etablering af engsvingel opnås ved at så dæksæden på hveranden række, og placere engsvinglen imellem kornrækkerne. Dette giver mest muligt lys til udlægget og derved de bedste betingelser for en god etablering. Ved såning af dæksæden på hver anden række, fastholdes plantetallet i vårbyggen, typisk 275 planter pr. m².

Er strandsvinglen veletableret på rækkeafstand, er der senere rig mulighed for at rækkebehandle mod græsukrudt i afgrøden. Det kan være mekanisk eller kemisk, hvor der sprøjtes i mellem rækkerne af engsvinglen. Der imod er der ingen effektive muligheder for at bekæmpe problematiske græsukrudsarter, som f.eks. rajgræs eller blød hejre, ved bredsprøjtning af engsvingel.



Den bedste etablering af engsvingel, fås ved at dæksæden sås på hver anden række

Såfremt udlægget og dæksæd ikke sås i samme arbejdsgang er det vigtigt at udlægget sås umiddelbart efter at dæksæden er sået så jordfugten bibeholdes. Kør helst lidt forskudt af såretningen for dæksæden, således at udlæg og dæksæd ikke står i samme række.



Såning af dæksæd, gødning og udlæg i en overkørsel

Gødskning i forbindelse med udlæg

Når gødningen til dæksæden placeres ved såning, er det en fordel at gemme cirka 30 kg N pr. ha, som efterfølgende bredspredes oven på jorden, så udlægget også er velforsynet med gødning i det øverste jordlag. Undgå overlab med gødningen så lejesæd undgås.

Ukrudtsbekæmpelse ved såning

Bekæmpelse af enårig rapgræs i engsvingel lader sig bedst gøre ved anvendelse af DFF umiddelbart efter såning. En behandling med 0,10 - 0,15 l pr. ha DFF på fugtig jord umiddelbart efter såning, giver god effekt på enårig rapgræs. En eventuel tromling skal foretages før DFF-behandlingen.

Det er en forudsætning for anvendelse af DFF, at engsvinglen er korrekt sået med en sådybde på 1,5 - 2 cm, og at engsvingel frøene er dækket af jord, da udlægget ellers kan skades.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF