

Vækstregulering og svampebekæmpelse i engsvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2020

- Vækstregulering aktuelt
- Svampebekæmpelse

Det absolut bedste udgangspunkt for et godt udbytte, er at engsvinglen står op ved blomstring. Men det er ligeledes vigtigt, at engsvinglen står op i frøfyldningsperioden helt frem til skårlægning. Vækstregulering af engsvingel skal udføres under hensyntagen til afgrødens tilstand og vækst. Da engsvingel er meget spildsom, er det vigtigt at afgrøden skårlægges, hvis afgrøden står op til høst.

Der kan anvendes op til 0,8 l pr. ha Moddus i stadie 31-48, fra begyndende strækning til lige før skridning.

Vækstreguleringen har den bedste effekt i afgrøder med god strækningsvækst, der er velforsynet med vand og ved dagtemperaturer over 15 grader samt nattemperaturer over 5 grader, hvilket ser ud til at kunne blive aktuelt i den kommende periode.

En veletableret afgrøde i god vækst og med god vandforsyning kræver den højeste Moddus-dosering.



Første knæ er mærkbart mange steder, og vækstregulering er aktuelt fra stadie 31.

Oftest vil én behandling med vækstregulering være tilstrækkelig i engsvingel. Vækstregulering foretages fra stadie 31-33, når 2. knæ er mærkbart på halvdelen af skuddene.

Ønsker man at dele vækstreguleringen, kan man indlede med 0,4 l pr. ha af et Moddus-produkt. Ca. to uger efter første behandling, følges op med op til 0,4 l pr. ha Moddus. Afhængig af nedbørsmængderne kan det være en god løsning, i afgrøder der ikke er velforsynet med vand.

Ved anvendelse af Moddus er opfodring af frøgræshalmen tilladt, såfremt afgrøden ikke er vækstreguleret efter stadie 33.

Sygdomme og skadedyr

Er der meldug af betydning, behandles med et svampemiddel. Men det er kun tilrådelig at blande svampe- og vækstreguleringsmidler, hvis afgrøden er velforsynet med vand.

Man kan f.eks. anvende 0,4 l pr. ha Viverda, der har rigtig god effekt på både meldug, rust og bladpletsvamp. Denne behandling kan også kombineres med en eventuel 2. vækstregulering, men kun i afgrøder velforsynet med vand.

Folicur, Amistar, og Comet Pro er ligeledes godkendt til svampebekæmpelse i engsvingel.

Er der begyndende angreb af lus, kan det være aktuelt at medtage 0,20 kg pr. ha Karate 2,5 WG.

Frøgræshalm, der er behandlet med svampe- eller insektmidler må generelt ikke opfodres.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF