

## Bladlus i hvidkløver

FrøavlsINFO nr. 4, 2020

- Tjek din mark for bladlus og andre skadedyr
- Brug Pirimor til en evt. bekæmpelse af lus
- Anvend altid stor vandmængde ved skadedyrsbekæmpelse

De første angreb af bladlus i hvidkløver er nu konstateret.

Vi opfordrer derfor til, at man tjekker hvidkløvermarken for forekomst af bladlus.

Bladlusene sidder på blomsterstilken og suger plantesaft. Er der mange bladlus, vil saftstrømmen til frødannelsen blive hæmmet, med mindre frøudbytte til følge. Hold derfor øje med udviklingen.

Pirimor 500WG er godkendt til [mindre anvendelse](#) til bekæmpelse af bladlus i hvidkløver med 200-300 gram pr. ha. Midlet må kun anvendes én gang pr. vækstsæson i afgrøden. En eventuel behandling skal ske i lunt, stille vejr, minimum 15°C, der fremmer dampvirkningen af midlet.

Pirimor er det produkt der bedst bekæmper bladlus, men virker ikke på kløvergnaver og kløversnudebiller.

Insektmidlet Mospilan SG er godkendt til [mindre anvendelse](#) mod skadedyr i kløver. Midlet må anvendes op til 2 gange pr sæson med 250 gram pr. ha pr. behandling.

Mospilan SG virker systemisk i modsætning til f.eks. Karate. Produktet forventes at have god

effekt på kløverhovedgnavernes larver, men effekt niveauet overfor de voksne biller af kløverhovedgnaver og kløversnudebiller kendes ikke.

Det er vigtigt at anvende insektmidler med forskellige virkemekanismer, så vi undgår resistens i skadedyrspopulationerne. Karate, Pirimor og Mospilan har hver deres virkemekanisme.



*Sådan kan et kraftigt angreb af bladlus udvikle sig i hvidkløver*

Med venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF