

Udlæg af ital. rajgræs i renbestand

FrøavlsINFO nr. 8, 2020

- **Gode betingelser for såning i ren-bestand**
- **Gødskning til nyt udlæg**

Ital. rajgræs sås normalt fra sidst i august til først i september, men såning i første halvdel af september kan forsvares. Erfaringerne viser, at der er færre problemer med sneskimmel og rajgræsmosaik i de efterårsudlagte arealer, som udbyttedmæssigt normalt er fuldt på højde med de forårsudlagte arealer.

Jordbearbejdning - pløjning

Et godt pløjearbejde forud for etablering er en stor fordel. Spildkorn og frø af ukrudtsgræsser skal ned i bunden af furen. Indstilling og kørselshastighed ved pløjning er vigtigt, så afgrøderester ikke kastes over på forrige fure og dermed kommer til at ligge i en dybde, hvor frø kan spire frem i såbedet.

Såning uden pløjning kan lade sig gøre, hvis der sås efter f. eks raps. Ved etablering uden pløjning er det meget vigtigt at kende bestanden af ukrudtsgræsser. Gold- og blød hejre eller

væselhale kan umuliggøre dyrkning af frø. Glyphosat behandling før såning er nødvendigt.

Udsædsmængde

Planternes kortere udviklingsperiode ved såning i renbestand medfører en mindre buskning med deraf færre frøstængler pr. plante. Derfor bør udsædsmængden øges med ca. 20 pct. i forhold til udlæg i dæksæd, men stadig skal udsædsmængden afstemmes efter sortens frøstørrelse.

Som udgangspunkt anbefaler vi 10 kg/ha i de diploide og 12 kg/ha i de tetraploide sorter. Sådybde 2-3 cm.

Gødskning

For at sikre en hurtig og tilstrækkelig udvikling af planterne, kan der ved såningen tilføres en mindre mængde kvælstof.

Ved såning i september er det tilrådeligt at give kvælstofmængde på 25-40 kg N pr. ha som udbringes ved såning.

Gødningen kan tilføres som NPK eller en ren kvælstofgødning.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF