

Etablering af rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 3, 2020

- Nyudlæg i ærter eller byg
- Udlægget spirer bedst og hurtigst når jorden er varmet lidt op
- Udlægget bliver bedst når både byg og rødsvingel sås på dobbelt rækkeafstand

Udlæg af rødsvingel

Rødsvingel lykkes bedst på lermuldede jorder, men kan også dyrkes på de lidt lettere jordtyper. Humusjorde er ikke egnede til dyrkning af rødsvingel.

Et godt resultat starter med etableringen

I foråret kan udlæg ske i vårbyg, vårhvede eller i ærter. Den normale udsædsmængde er 5-8 kg udsæd pr. ha. Højeste mængde i sorter uden udløbere og/eller ved mindre bekvemt såbed. Sådybden bør være 1,5 - 2 cm. Ved dybere såning spirer frøet ikke.

Det er vigtigt, at frøet placeres i fugtig og lun jord, på fast bund. Det tager 27 dage for halvdelen af rødsvingelfrøene at spire frem ved 5°C, men kun 12 dage, hvis jorden er 8°C.

Udlæg i ærter

Udlæg af rødsvingel i ærter er velegnet for alle typer af rødsvingel.

Ved såning af ærter og rødsvingel hver for sig, bør der tromles inden såning af rødsvingel.

Udlæg i vårbyg

Vælg så vidt mulig en stråstiv vårbygssort (maltbyg) med lav tendens til aks - og strå nedknækning, www.sortinfo.dk. Det er afgørende at byggen står op til høst, og som hovedregel skal udlægsmarken vækstreguleres. Byggen skal ikke gødes for kraftigt og anvender man placeret gødning til vårbyg ved såning, styrker det udlægget at tildele de 25-30 kg N pr.

ha på overfladen, så græsset får gavn af gødningen.

Rækkeafstand og såudstyr

Såning af både dæksæd og frø på dobbelt rækkeafstand er den bedste udlægsmetode.

På de fleste såmaskiner er det muligt med påbygget frøsåkasse, at så udlæg og korn med hver anden tragt og placere frørækkerne mellem kornrækkerne. Slangerne føres fra frøsåkassen ned i de bageste tragte, så frøet sås med de bageste tragte og kornet med de forreste tragte.

Allerbedst er en præcis dybderegulering styret af en trykrulle. Dette system fungerer rigtig godt i praksis og giver gode og sikre udlæg.

Er der ikke trykruller efter de såtragte, der sår frø, anbefaler vi at tromle staks efter såning under tørre forhold.

Ukrudtsbekæmpelse ved såning

Bekæmpelse af enårig rapgræs i rødsvingel er mulig med anvendelse af DFF umiddelbart efter såning. En behandling med 0,1 l pr. ha DFF på fugtig jord umiddelbart efter såning, giver god effekt på enårig rapgræs. Det er vigtigt at rødsvingel frøene er dækket af jord, for ikke at skade rødsvingelen ved behandlingen.

Eventuel tromling foretages før DFF sprøjtning. For at undgå skade på rødsvingel skal frøet være placeret i en dybde på 1,5 -2 cm, og frøene skal være dækket af jord, ellers vil DFF kunne hæmme fremspiringen af udlægget.

Store nedbørsmængder umiddelbart efter anvendelse af DFF kan skade rødsvingel kimplanterne.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF