

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med udlæg af rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2020

- Udlæg i ærter og vårbyg
- Opfølgning, udlæg i vintersæd

Udlæg i ærter:

Anvend Stomp CS + Fighter 480 med 10 - 14 dages mellemrum:

1. behandling: 0,4 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS pr. ha udføres, når det første ukrudt er på kimbladsstadiet

2. behandling: 0,5 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS pr. ha udføres, når nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet. Ærter må tildeles maksimalt 0,9 l pr. ha Fighter 480 i split og 1,0 l pr. ha såfremt behandlingen ikke deles.

Ved anvendelse af Stomp CS skal rødsvingel frøene være dækket af mindst 1 cm jord.

Udlæg i vårbyg:

Mod enårig rapgræs kan DFF anvendes med op til 0,1 l pr. ha umiddelbart efter såning på fugtig jord. Sørg for at rødsvingel frøene er dækket af mindst 1 cm jord for at undgå skade. Ved større nedbørsmængder umiddelbart efter behandlingen, kan rødsvingel skades af DFF.

Hussar OD må anvendes med 0,035 l pr. ha og Hussar Plus OD med 0,05 l pr. ha mod enårig rapgræs samt vindaks og rajgræs. Begge midler har bred effekt på tokimbladet ukrudt. Begge midler tilsættes 0,5 l olie pr. ha.

Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt

Hvis der er anvendt DFF lige efter såning, kan opfølgning ske med f.eks. Mustang Forte, Zypar, Catch, Starane XL og/eller Express SX.

7,5 g Express SX i blanding med enten 0,075 l Primus (specielt kamille) eller 0,5 l Zypar (specielt hundepersille og storkenæb) pr. ha, har bred effekt mod tokimbladet ukrudt.

Tidsler bekæmpes bedre med 0,4 - 0,6 l Catch eller 0,5 l Mustang Forte pr. ha, sammen med Express. Tidslerne skal være godt fremme på behandlingstidspunktet.

Det er vigtigt at kombinere flere virkemekanismer for at forebygge herbicid-

resistens. Hvis ikke der er anvendt DFF ved såning, kan der tilsættes 0,05 l DFF pr. ha til at forstærke effekten mod agerstedmoder, ærenpris og rød tvetand.

DFF må kun anvendes én gang pr. sæson. Produkter med aktivstofferne i Hussar og Express må ikke anvendes i samme vækstår. Uddybende info om anvendelse af Mustang Forte findes på [Middeldatabasen](#).

MCPA

MCPA anvendes mod rod ukrudt som f. eks. tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha i vårbyggs stadiet 20-39. Bedst effekt ved min. 20°C, stor vandmængde og langsom fremkørselshastighed. Træk behandlingen til der er adskillige grønne blade på tidslerne.

Primera Super kan med 1,0 l pr. ha anvendes mod flyvehavre og agerrævehale frem til stadiet 29.

Udlæg i vintersæd, opfølgende behandling i foråret:

Express SX anvendes mod nyt ukrudt med 7,5 g pr. ha evt. i blanding med 0,05 l pr/ha DFF. Mod mange burrenerre eller store kamiller kan suppleres med 0,75 l Zypar eller 0,75 l Starane XL pr. ha. 0,75 l Mustang Forte pr. ha er velegnet til frø ukrudt og tidsler.

Mod enårig rapgræs i vinterbyg anvendes Hussar OD med 0,025 l eller Hussar Plus OD med 0,035 l pr. ha + 0,5 l olie pr. ha. I hvede anvendes Hussar OD 0,05 l eller Hussar Plus OD 0,07 l pr. ha + olie. Hussar har effekt mod enårig rapgræs, vindaks, alm. rajgræs og tokimbladet ukrudt. I denne gruppe midler (Express SX, Trimmer, Nuance, Hussar) må man kun anvende ét af midlerne én gang pr. vækstår.

Mod agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs kan anvendes Topik 0,4 l pr. ha frem til stadiet 29 eller 1 l Primera Super pr. ha frem til stadiet 39.

Venlig hilsen
DLF
Avlsafdelingen