

Vækstregulering og svampebekæmpelse i strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 6, 2020

- Vækstregulering aktuell i de kraftigste marker men først efter påske
- Svampebekæmpelse kan vente

Vækstregulering

Afgrøderne groede det meste af vinteren og specielt afgrøder af fodertyperne var meget vegetative allerede i starten af marts, men de seneste 3 uger har væksten været gået i stå på grund af lave temperaturer.

Strandsvingel giver en meget positiv udbytterespons for vækstregulering. Der anvendes normalt 0,8 l Moddus pr. ha i maj i perioden fra strækningsstadiet frem til begyndende skridning.

I kraftige marker med højt N-niveau og fodertyper af [strandsvingel](#), kan det være en fordel at vækstregulere to gange.

Anbefaling:

- Som udgangspunkt anbefaler vi en vækstregulering med 0,8 l Moddus M pr. ha eller tilsvarende produkt ved st. 49, lige før begyndende skridning i maj. Husk spredeklæbemiddel.
- I meget kraftige velgødede marker i god vækst og med god vandforsyning, kan man indlede vækstreguleringen med 0,75 Medax Top når 2. knæ kan erkendes på 10 pct. af stænglerne.
Denne behandling følges op med 0,8 l Moddus M pr ha ved begyndende skridning.
- Alternativt kan man begynde med 0,4 l af et Moddus produkt i stadiet 32. Opfølgning ved skridning efter afgrødens vækst og [vandforsyning](#). Her anvendes 0,4 l pr. ha af et Moddus produkt, som kan forstærkes med op til 0,75 l Medax Top pr. ha.

Bemærk at den maksimale dosering i alt er 0,8 l pr. ha af et Moddus-produkt pr. vækstsæson. Find oversigt over godkendte vækstreguleringsmidler og deres indhold af aktivstoffer [her](#).

Det er kun tilladt at opfodre vækstreguleret frøgræshalm, hvis der ikke behandles senere end stadiet 33 med Moddus. Medax Top behandlede afgrøder må ikke opfodres. Ved anvendelse af Moddus er det vigtigt, at afgrøden er velgødet,

der er gode vækstforhold og god vandforsyning, samt dagtemperaturer over 15 grader.

Svampebekæmpelse i strandsvingel

Meldugbekæmpelse i strandsvingel har i forsøgende ikke vist den store lønsomhed. Angreb af meldug i strandsvingel udvikler sig hurtigt, og kan blive så kraftige at marken støver af meldug. Normalt forsvinder angrebet igen, også uden brug af svampemiddel. I forbindelse med en tidlig vækstregulering skal der derfor normalt ikke medtages et svampemiddel.

Fra begyndende skridning og frem til blomstring kan der behandles med 0,2 - 0,4 l Bell + 0,15 l Comet Pro pr. ha.

Bell er især aktuell, hvis der er bladpletsvampe i afgrøden. Dosering er 0,5-0,75 l/ha Bell uden blandingspartner. Svampebehandlet frøgræshalm må ikke opfodres.

Bland kun svampemidler og Moddus hvis afgrøden er velforsynet med vand. I 2018, hvor forholdene var meget tørre, så vi afgrødeskade, hvor svampemiddel og vækstreguleringsmiddel blev blandet sammen.



Strandsvingel Tower, den 20. marts 2020, ca. 40 cm høj afgrøde, men kun blade.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF