

Kvælstofnormer til markfrø høst 2017

REVIDERET UDGAVE, AUGUST 2016*

Kilde: NaturErhvervstyrelsen

[Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler i planperioden 1. august 2016 til 31. juli 2017](#)

Frøart	Oprindelig N-norm	Vejledende N-mængder		Revideret N-norm
	2015/2016	Efterår	Forår	2016/2017
	kg / ha			
Alm. rajgræs	135	0-30	140-160	170
Alm. rajgræs efterårsudlagt, 1. års	167	0-30	140-160	210
Italiensk rajgræs	100	0-30	90-120	125
Italiensk rajgræs efterårsudl. 1. års	131	0-30	90-120	165
Hybrid rajgræs	112	0-30	110-140	140
Hybrid rajgræs, efterårsudl. 1. års	143	0-30	110-140	180
Westerwoldisk rajgræs	96	0	100-120	116
Timote og knoldrottehale	88	0-30	30-100	110
Hundegræs	159	50-60	120-130	200
Engsvingel	96	30-40	60-80	120
Bakkesvingel	119	60-70	50-60	150
Rødsvingel lange udl.	119	60-80	45-60	150
Korte og uden udløbere	119	60-80	50-60	150
Rajsvingel, festulolium	127	0-30	120-140	160
Rajsvingel efterårsudlagt	159	0-30	120-140	200
Strandsvingel	159	50-60	100-120	200
Krybhvene og alm. hvene	96	45-60	50-60	120
Alm. rapgræs	104	30	70-90	130
Engrapgræs marktype	127	60-75	70-85	160
Engrapgræs plænetype	135	60-75	75-90	170
Engrapgræs efter kløver	127/135	45-60	60-80	160/170

*Opdateret d. 9/8 2016

N-normerne til græsfrø til høst 2017 er forhøjet med ca. 7 procent i forhold til kvælstofnormen for 2015/16.

Venlig hilsen
DLF